JANVIER 1914

LISTE DES GRAINES

OFFERTES PAR LE

JARDIN CORREVON

(Jardin alpin d'acclimatation)

Floraire — Chêne-Bourg, GENÈVE

31me CATALOGUE DE GRAINES

Terrestria sidera, flores.



For English Customers

Orders and communications may be adressed to M. E.-W. Clayforth, Oak Mount, Higfield, Southampton. He will be able too to send catalogues and seedlist.

AVIS

La plupart des volumes de M. Correvon sont épuisés. Nous venons de retrouver 5 exemplaires du volume "Fougères rustiques" (6 fr.) qui nous a été fréquemment demandé et que nous avions dû refuser. Avis aux amateurs. Par contre, il est inutile de nous demander les ouvrages suivants : "Plantes des Alpes", "Album des Orchidées", "Flore coloriée" et sa traduction italienne. Voir pour de plus amples renseignements à la p. 3 de la couverture.

Le nouvel ouvrage de M. Correvon est annoncé par circulaire dans ce catalogue; c'est un résumé des ouvrages épuisés, sous le titre : "Les plantes des montagnes et des rochers", leur alimentation et leur culture dans les jardins. Treize chapitres dont un est le dictionnaire-vademecum du cultivateur de ces plantes et contient la liste de toutes les espèces introduites avec l'indication de leur indigénat, de l'époque de leur floraison, de la hauteur de la plante, couleur des fleurs et mode de culture. Un chapitre Fougères, un autre Orchidées rustiques; un sur les Cactées rustiques, un sur les Lys, etc.

Prix : 10 fr., port en sus.

LISTE DES GRAINES

OFFERTES PAR LE

JARDIN CORREVON

(Jardin alpin d'acclimatation)

Floraire — Chêne-Bourg, GENÈVE

Nous ne donnons pas ici la description des plantes parce que la plupart de nos clients possèdent le volume « Plantes de montagnes et de rochers et leur acclimatation », par H. Correvon et que, d'autre part, notre catalogue de plantes contient plusieurs de ces descriptions. Voir aux annonces.

Toutes nos semences se vendent au prix de 50 cent. le paquet

Cette année-ci nous sommes en mesure de fournir un certain nombre d'espèces au poids, et nous indiquons leurs prix spéciaux en marge des noms.

Les personnes que le choix d'une collection embarrasse peuvent nous abandonner ce soin. Nous faisons des collections de graines *à notre choix :*

12 espèces pour	5 francs
25 » »	10 »
50 » »	20 »
100 » »	40 »

This year we are able to offer any of our seeds in larger quantity, so we put the price for those kinds (the most valuable and popular) by weight. The gramme = $^1/_{30}{}^e$ oz.

Our seeds are all sold to the price of 50 cts. (5 d.) each paquet.

We make collections to our own choice :

12 kinds for	5 francs (4 sh.)
25 » »	10 » (8 sh.)
50 » »	20 » (16 sh.)
100 » »	40 » (32 sh.)

Alsine juniperifolia.
» laricifolia.
» liniflora.
» pinifolia.
» recurva.
» Rosani.
» setacea.
» stricta.
» tenuifolia.
» verna.
» villarsii.
Althæa rosea (Rose trémière).
» fimbriata alba.
» à fl. simples, de toutes couleurs, 10 gr. 1 fr.
» à fl. pleines, dans les plus belles variétés, 10 gr. 2 fr.
» à fl. roses doubles, 10 gr. 2 lr.
» à fl. jannes doubles, »
» à fl. noires, doubles, »
» Theresina.
Les Passeroses sont des pl. vivaces d'ornement de premier ordre et de cult. facile.
Alyssum alpestre.
» amanum.
» arenarium.
» argenteum, 10 gr. 1 fr. Bon à semer dans les grands rochers et les pentes sèches.
» calyocarpum.
» condensatum.
» creticum.
» cypriense.
» gemonense.
» halimifolium.
» hirsutum (récolté en Orient).
» idaeum.
» leucadeum.
» lucidum.
» Mœllendorfianum.
» montanum.
» obovatum.
» orientale.
» ovirense.
» petræum.
» pyrenaicum. 1 gr. 2 fr.
» rostratum.
» saxatile, 10 gr. 2 fr.
» » var. citrinum.
» » var. compactum.
» scardicum.
» serpyllifolium, 5 gr. 4 fr.
» spinosum speciosum, 5 gr. 4 fr.
» stribnyi.
» tortuosum.
» transylvanicum.
» Wiersbickii, 10 gr. 1 fr.
Alyssum Wulfenianum.
Amelanchier canadensis.
» rotundifolia.
» utahensis.
» vulgaris *(arbre aux Edelweiss).*
Amphirapis albescens.
Amygdalus nana.
Amsonia latifolia, 10 gr. 2 fr.
» salicifolia, 10 gr. 2 fr.
Très jolies pl. de la famille des Pervenches.
Anagallis grandiflora (mouron à grandes fleurs) 5 gr. 1 fr.
Anchusa Barrelieri.
» Dropmoreana, 10 gr. 4 fr.
» italica, 10 gr. 2 fr.
» » var. Opale.
» » var. Lissadell.
» » var. Perry.
Bonnes Bourraches vivaces de grandes dimensions, aux innombrables fl. d'un bleu intense (Mai-octobre).
» officinalis.
» sempervirens.
Andrachne colchica.
Androsace albana.
» arachnoidea.
» Brigantiaca.
» carnea, 1 gr. 1 fr.
» chamaejasme.
» Charpentieri.
» Chumbyi.
» ciliata.
» cylindrica.
» elongata.
» foliosa.
» glacialis, 1 gr. 1 fr. 50.
» Halleri.
» Hedreantha, 5 gr. 5 fr.
» Helvetica, 1 gr. 1 fr. 50
» hirtella.
» imbricata (*argentea*), 1 g. 1 f. 50.
» lactea.
» Laggeri.
» lanuginosa.
» Mathildæ.
» multiceps.
» obtusifolia.
» occidentalis.
» oculata.
» Pacheri.
» primuloides.
» pubescens.
» pyrenaica.
» sarmentosa.
» sempervivoides.
» septentrionalis.

Androsace villosa.
» vitaliana, 1 gr. 1 fr.
» Wulfeniana.
Anemone albana.
» alpina, 10 g. 2 fr., 100 g. 10 fr.
C'est la grande et belle anémone à fl. blanches des régions alpines. On l'élève facilement de graines, mais celles-ci germent lentement.
» apennina.
» Baïkalensis.
» Baldensis, 10 gr. 4 fr. ; 5 gr. 2 francs
» canadensis.
» cernua.
» decapetala.
» dichotoma.
» globosa.
» Halleri.
» Hepatica (Hépatique), 10 g. 4 f.
» japonica.
» lactea.
» Lyalli (ex Canada).
» montana, 10 gr. 2 fr.
» multifida.
» narcissiflora, 10 gr. 2 fr.
L'une des plus faciles à cultiver, mais à germination lente ; fl. roses en jolis bouquets dressés.
» narcissiflora var. villosa.
» nigricans.
» patens.
» » lutea.
» pennsylvanica.
» polyantha.
» pratensis.
» » var. obsoleta.
» propera.
» pulsatilla, 10 gr. 2 fr.
» » var. alba.
» Regeliana.
» riparia.
» rivularis.
» rubra, 10 gr. 2 fr.
» sulfurea, la belle anémone soufrée des Alpes, 100 gr. 10 fr. ; 10 gr. 2 fr.
» sylvestris, 10 gr. 4 fr.
Grande fl. blanche à revers rose ; pl. envahissante et de culture facile.
» sylvestris major.
» trifoliata.
» Udensis.
» vernalis (à fl. de soie et d'opale), 100 g. 15 f. ; 10 g. 3 f.

Anémone virginica.
» vitifolia.
Anemonopsis macrophylla.
Angelica Archangelica (*Angélique*).
» pyrenaica.
Antennaria alpina.
» carpathica.
» dioica.
» monocephala.
» plantaginea.
» triplinervis.
Anthemis aetnensis.
» carpathica.
» cinerea.
» Hausknechtii.
» macedonica.
» montana.
» nobilis (camomille romaine).
» petræea.
» rigescens.
» tenuifolia.
» tinctoria.
Anthericum ramosum. Petit lys blanc des rochers, très florifère.
Anthyllis montana, 10 gr. 4 fr.
» vulneraria.
Antirrhinum asarina, 10 gr. 5 fr.
Excellent pour les murs et rochers au soleil.
» gibraltaricum.
» glutinosum.
» majus, type sauvage.
» » (Mufflier), 10 gr. 1 fr.
» » albus, 10 gr. 1 fr.
» » atrosanguineum, 10 gr. 2 fr.
» » coralinum, 10 gr. 2 fr.
» Lightrose, 10 gr. 2 fr.
» sempervirens.
» siculum.
» tortuosum (récolté dans les ruines romaines de Fréjus).
Aphyllanthes monspeliensis.
Aplopappus croceus.
» Parryi.
Apocynum venetum.
Aponogeton dystachion (aquatique).
Aposeris fœtida.
Aquilegia alba.
» » grandiflora.
» alpina, 10 gr. 8 fr. ; 1 gr. 1 fr.
C'est la plus belle des Ancolies ; très grande fleur d'un azur intense. Récoltée dans les Alpes.
» arctica.
» atrata, 10 gr. 1 fr.
» baïkalensis.

Aquilegia bertoloni.
» burgeriana.
» californica.
» calif. hybrida.
» canadensis.
» caucasica.
» chrysantha, 10 gr. 2 fr.
» » grandiflora.
» » nana.
» cœrulea (Floraire), 10 gr. 6 fr.
» cœrulea (récoltée dans les Montagnes Rocheuses), 10 g. 8 fr.
» cœrulea alba.
» cœrulea candidissima.

L'Aq. cœruleà et ses var. est l'une des plus merveilleuses d'entre les plantes de montagne.

» Durandi.
» Einseleana.
» flabellata. Blanc pur.
» formosa. (ex Canada).
» glandulosa (type), 1 gr. 1 fr.
» » var. rosea.
» Haylodgensis, 10 gr. 4 fr.
» » delicatissima, 10 gr 6 fr.
» Helenæ.
» hybrida, extra de Barr.
» » superba, de Dod.
» » Floraire.
» Jetschani.
» jucunda.
» lactiflora.
» longicalcarata.
» Olympica (d'Orient).
» Othonis.
» oxypetala 1 gr. 1 fr.
» pyrenaica, 1 gr. 1 fr.
» sibirica.
» skinneri. Fl. rouge et jaune.
» stenopetala.
» thalictrifolia.
» truncata Fl. rouge et jaune brillante.
» viridiflora (vraie).
» vulgaris.

Les ancolies sont d'excellentes pl. d'ornement, de culture, très facile, s'accomodant également de l'ombre et du soleil, mais préférant la mi-ombre et la fraîcheur. Leurs graines germent de suite.

Arabis albida.
» alpina.
» arenosa.
» aubrietioides.

Arabis bellidifolia.
» Berninæ.
» bryoides (ex Mont Athos).
» caucasica.
» cebennensis.
» cenisia.
» cœrulea.
» Collinsii.
» Drummondi.
» Halleri.
» hirsuta.
» Holbœlli.
» hybrida.
» incanescens.
» japonica
» lucida.
» nordmanniana.
» ovirensis.
» pendula.
» petraea.
» petrogena.
» procurrens.
» pumila.
» purpurascens.
» rosea.
» Soyeri.
» stelleri.
» suecica.

Arctium tomentosum.

Arctostaphylos alpina.
» navadensis.
» tomentosa.
» Uva Ursi (*Raisin d'Ours*).

Arctotis grandis.

Arenaria Armeriastrum.
» Balearica.
» biflora.
» cæspitosa.
» capitata.
» cephalotes.
» ciliata.
» dianthifolia.
» gracilis, 1 gr. 1 fr.
» graminifolia, 5 gr. 2 fr.
» grandiflora, 5 gr. 2 fr.
» gypsophiloides.
» hispida.
» Kingii.
» Koriniana.
» Kotschyana, 5 gr. 4 fr.
» lanceolata
» laricifolia.
» longifolia.
» montana.
» nardiflora.
» peploides.
» purpurascens.
» Sajanensis.

Arenaria Saxifraga.
» sericea.
» Steveni.
» tridentina.
» verna
Argemone hispida.
» mexicana.
» platyceras.
Pavots épineux d'Amérique.
Arisarum vulgare
Arsitolochia ornithocephala.
» rotunda.
Armeria alpina.
» arborea.
» cæspitosa.
» Halleri.
» majellensis.
» maritima.
» plantaginea.
» sibirica (ex Groënland).
» vulgaris.
Pl. solides et florifères connues sous le nom de gazon d'Espagne ou d'Olympe.
Arnebia echioides.
Arnica amplexicaulis.
» chamissonis.
» cordifolia.
» latifolia.
» longifolia.
» montana, 10 g. 3 fr.; 5 g. 2 fr.
Aronicum glaciale.
» scorpioides, 1 gr. 1 fr.
Artemisia absinthium.
» annua.
» arborea.
» argentea.
» atrata.
» austriaca.
» canadense (ex Canada).
» cœrulescens.
» cretacea.
» discolor.
» frigida.
» glacialis.
Le Genépi des Piémontais.
» glauca.
» granatensis.
» lanata.
» maritima.
» mutellina (*genépi alp.*) 5 gr. 4 fr.
» nana.
» paniculata.
» parviflora.
» pedemontana.
» rupestris.
» sacrorum.
» scoparia.
Artemisia spicata (*le vrai genépi*), 1 gr. 1 fr.
» stelleriana.
» suavis.
» turkestanica.
» valesiaca.
Jolies composées alpines aromatiques au feuill. finement divisé et généralement blanc d'argent. Soleil.
Arthropodium cirrhatum.
Arum Dracunculus.
» italicum
Asarum canadense.
» caudatum.
» europæum.
Asclepias Cornuti (pl. aux oiseaux).
» curassavica.
» Hallii.
» incarnata.
» rubra.
» speciosa.
» tuberosa, 10 gr. 3 fr.
L'une des plus brillantes pl. vivaces; fl. orangé très vif.
Asparagus acutifolius.
» tenuifolius.
» verticillatus.
Asperula azurea, 10 gr. 2 fr.
» cynanchica.
» galioides.
» hirta.
» humi usa.
» longiflora.
» odorata (*Waldmeister*).
» orientalis.
» taurina.
Asphodelus albus (*Asphodèle*), 10 g. 1 f.
» fistulosus.
Asphodeline Balansæ.
» cretica, 10 gr. 1 fr.
» gigantea.
» lutea, 10 gr. 1 fr.
Aster alpinus, 5 gr 2 fr.
» » à fl blanches, 5 gr. 2 fr.
» » lapponicus.
» » speciosus, 5 gr. 5 fr.
» amelloides, 5 gr. 2 fr.
» Amellus, 5 gr. 2 fr.
» bessarabicus.
» conspicuus (ex Canada).
» curtisii (ex America).
» diplostephioides, 5 gr 4 fr.
Superbe espèce basse de l'Himalaya.
» Fremonti.
» Garibaldii.
» himalaicus.

Arter Ibericus.
» » grandiflorus.
» Patersonni.
» lævis.
» Porteri (ex Colorado) 10 g. 2 fr.
» Ptarmicoides.
» Pseudo-Amellus.
» pumilus.
» pyreneus (vrai).
» sericeus (ex Colorado).
» sibiricus.
» sikkimensis
» simplex.
» Townsendi.
» trinervius.
» turbinellus.
Astilbe Davidi, 10 gr. 4 fr.: 5 gr. 2 fr.
Délicate panicule de fl. roses, dressée en gros épis; pour lieux humides.
» Japonica.
» rivularis.
Astragalus alopecuroides (vrai), 10 gr. 4 fr.
» alpinus. 10 gr. 4 fr.
» angustifolius (ex Oriens).
» aristatus, 10 gr. 4 fr.
» cicer.
» confirmans.
» depressus.
» galegiformis.
» glyciphylloides.
» juvenalis.
» massiliensis.
» maximus.
» melilotoides.
» monspessulanus, 10 gr. 4 fr.
» Onobrychis.
» pseudo-Onobrychis,
» racemosus.
» reflexistipulus.
» sanguinolentus.
» Sieversianus.
» Transoxanus.
» uliginosus.
Astrantia bavarica.
» Biebersteinii.
» carinthiaca.
» carniolica.
» gracilis.
» helleborifolia.
» major, 10 gr. 2 fr.
Plante très montagnarde et des plus facile à cultiver; l'une des meilleures pl. mellilères.
» major à fl. roses.
» minor.
» neglecta.
Astrantia pauciflora.
Astrocarpus sesamoides.
Astydamia canariensis.
Athamante cretensis.
» Matthioli.
Atragene alpina, 10 gr. 4 fr.
» » à fl. blanc pur.
» » à fl. rouges.
Atriplex hortensis.
» rosea.
Atropa Belladona *(Belladone)*.
» » à fruits jaunes.
Aubrietia antilibani.
» cilicica.
» Columnæ.
» deltoidea, 10 g. 5 fr.; 5 g. 3 fr.
» D. Mules.
» Eyrii.
» erubescen (ex mont Athos)
» græca.
» Hendersonni.
» Leichtlini.
» libanstica.
» Lilac Queen.
» "Lloyd Edward".
» Mauve Queen.
» Moehreimi.
» Olympica.
» Pinardi.
» purpurea.
» Richardsoni.
» violacea.
Petites Crucifères vivaces formant des tapis couverts de fl. d'un lilas plus ou moins vif suivant les espèces. Excellentes pour les murailles.
Avena argentea.
» elatior.
» flavescens.
Azalea mollis (var. anglaises).
» procumbens.
Ballota spinosa.
Banffia petræa.
Baptisia australis. 10 gr. 1 fr.
» exaltata.
» minor.
Gros Lupins vivaces à fl. bleues.
Bartsia alpina.
Bellidiastrum Michelli.
Bellis cœrulescens.
» integrifolia.
» perennis.
» sylvestris.
Bellium bellioides.
» crassifolium.
» minutum.

Berardia subacaulis. Pl. très curieuse et très rare, récoltée dans la station classique du Haut Queyras, 5 gr. 3 fr.
Berberis stenophylla.
» Wilsoni; le plus beau du genre, nouvellement introduit de l'Asie centrale.
» Yunnanenense.
Berkheya purpurea.
» Adlami.
Berteroa incana.
Beta trigyna.
Betonica alopecuros.
» grandiflora, 5 gr. 2 fr.
» grandiflora superba. 5 g. 2 f. 50.
» hirsuta, 5 gr. 1 fr.
» macrostachya.
» officinalis, 5 gr. 1 fr.
» » alba
» orientalis.
» scardica.
» stricta.
Betula nana.
Biebersteinia orphanidis.
Bigelowia graveolens.
Biscutella lævigata.
» lucida.
Blitum capitatum.
» virgatum (Epinard-fraise), 10 gr. 2 fr.
Plantes très curieuses, portant comme des fraises d'un vermillion très vif, à l'aisselle des feuilles.
Bocconia cordata.
» microcarpa.
Borago laxiflora.
Boykinia aconitifolia.
» elata.
» occidentale
» rotundifolia.
Brassica repanda.
» Richeri.
Braya alpina.
» pinnatifida.
» supina.
Brickelia grandiflora.
Briza media.
» lutescens.
Bromus squarrosus.
» tectorus.
Budleya albiflora.
» nivea.
Budleya variabilis, 10 gr. 2 fr.
Arbuste à croissance rapide, à floraison abondante (fleurs en grappes violet et or) et qu'on élève facilement de graines.
Bulbocodium vernum.
Buphtalmum grandiflorum, 5 gr. 2 fr.
» salicifolium.
» speciosissimum (très rare).
Bupleurum falcatum.
» fruticosum.
» longifolium.
» ranunculoides.
» stellatum.
Caesalpinia Giliesi.
» japonica.
Caccinia glauca, 5 gr. 1 fr.
Calamintha acynos.
» alpina.
» grandiflora.
» Vuachensis.
Calandrinia compressa.
» discolor.
» grandiflora.
» sedicea.
» speciosa.
» umbellata.
Calendula grandiflora.
« sulfurea.
» à fl. pleines (soucis), 5 gr. 1 fr.
Calceolaria pinnata.
» polyrrhiza.
Calla palustris (aquatique).
Calliopsis (Coreopsis) versicolor.
Callirhoe pedata.
» verticillata.
Caltha alpina.
» leptosepala.
» palustris.
» polysepala.
» radicans.
Calypso borealis (ex Canada).
Calystegia dahurica.
Camassia esculente.
Camomille (v. Anthemis nobilis).
Campanula abietina.
» acutangulare.
» aggregata.
» alaskana (ex Canada).
» alliariæfolia, 10 gr. 2 fr.
» Allionii, 10 g. 8 fr.; 5 g. 5 fr.
» alpina.
» barbata, 10 g. 5 fr.: 5 g. 3 fr.
» » à fl. blanches.
» Baumgartenii.
» betonicæfolia.
» bononiensis.
» Burgalti.
» cæspitosa, 5 gr. 4 fr.
» cantburyana, 5 gr. 3 fr.
» capitata.

Campanula carnica.
» carpathica, 10 gr. 1 fr.
» » à fl. blanches 10 g. 1 f.
» » à fl. lilas clair, 10 g. 2 f.
» » var. compacta. 10 g. 2 f.
» » var. Ditton's blue.
» » var. grandiflora, 10 g. 4 f.
» « var. pelviformis.
» » Riverslea.

Le C. carpathica et ses variétés (faciles à élever de semis) sont d'excellentes pl. de rochers, de platebandes et de bordures; fleurissent de mai jusqu'en automne; grandes fl, violettes ou blanches; pl. basses et formant tapis.

» carpathica × pulla.
» caucasica.
» cenisia.
» collina.
» Correvoniana.
» crispa.
» cristallocalyx, 5 gr. 2 fr.
» dahurica
» elatnoides.
» eriocalix.
» eriocarpa.
» excisa.
» Fergusoni.
» flexuosa.
» fragilis.
» garganica.
» glomerata.
» » var. à fl. blanches.
» » var. acaulis.
» grandis.
» » à fl. blanches.
» Grossekii.
» Hohenackeri.
» Imeritina, 5 gr. 2 fr,
» incurva
» Kolenatiana, 5 gr. 2 fr.
» lactiflora, 5 gr. 3 fr.
» lamiifolia 5 gr. 2 fr.
» latifolia, 5 gr. 2 fr.
» » à fl. blanches.
» » alba grandiflora.
» libanotica.
» lingulata.
» longistyla.
» macrantha, 10 gr. 2 fr.
» » à fl. blanches.
» macrostachia.
» macrorhiza.
» medium, type des Hautes-Alp.
» michauxioides.
» médium, des jardins.

Campanula mirabilis.
» multiflora
» muralis (Portenschlagiana).
» nobili-macrantha.
» pelviformis.
» persicifolia, 5 gr. 2 fr.
» » à fl. blanches.
» petiolata
» petræa
» phytidocalix.
» primulæfolia.
» pulla.
» pulloides.
» punctata.
» » var. à fl. blanches.
» pusilla, 5 gr. 3 fr.
» » var. à fl. blanches.
» » var. Willmottiana.
» pyramidalis, 10 gr. 4 fr.
» » à fl. bl., 5 g, f. 2.50.
» Raddeana.
» Raineri (ex Alpi Bergamensis), 1 gr. 1 fr.
» rapunculus.
» rapunculoides.
» rhomboidalis.
» » à fl. blanches.
» rotundifolia, 10 gr. 2 fr.
» » à fl. blanches.
» » ruthenica.
» Sarmatica, 10 gr 2 fr.

Très belle espèce voisine de barbata, facile à cultiver et très florifère

» Saxifraga, 1 gr. 1 fr.
» Scheuchzeri.
» » à fl. blanches.
» Scouleri.
» sibirica.
» speciosa, 1 gr. 1 fr.
» spicata, 5 gr. 3 fr.
» spicato × thyrsoidaea.
» stenocodon.
» Steveni.
» subpyrenaica, 5 gr. 2 fr.
» Tenorii.
» thrysoidæa, 5 gr. 3 fr.

Belle espèce montagnarde à fl. jaunes.

» tomentosa.
» Tommasiniana.
» Trachelium, 5 gr. 2 fr.
» » à fl. bl., 5 gr. 2 fr.
» » à fl. doubl., 5 g. 2 fr.
» turbinata, 5 gr. 2 fr.
» » à fl. blanch., 5 g. 2 fr.
» tyroliensis.
» uniflora (ex Laponia)

Campanula urticifolia, 5 gr. 2 fr.
» Valdensis.
» Vanneri, 1 gr. 1 fr.
» velutina.
» Venzloi.
» versicolor.
» Vidali.
» Waldsteiniana.
» Wilsoni.
» Zoyzii.
Les Camp. sont faciles à élever par semis Les espèces les plus faciles, les plus florifères et les plus jolies sont : Alliariæfolia, carpathica, eryocarpa, lactiflora, persicifolia, pusilla, sarmatica et turbinata. Les alliariæf. et nobilis sont à fl. blanches, thrysoidæa à fl. jaunes et les autres à fl. lilas plus ou moins foncé, sauf leurs var. à fl. blanches. Toutes fleurissent dans l'été, à partir de la fin de mai, et sont excellentes pour les rocailles ou la platebande.
Canarina campanula.
Capparis rupestris *(Câprier)*.
Capsella pauciflora (rare).
Caragana Altagana.
Cardamine alpina.
» asarifolia.
» chenopodifolia.
» glauca.
» Jezoensis.
» macrophylla
» resedifolia.
» sibirica.
Carduus acanthoides.
» aurisocus.
» defloratus.
» eriocephalus.
» nutans.
Carex atrata.
» Baldensis.
» bicolor.
» Buchanani (à verdure brune).
» flava.
» Grayi.
» nigra.
Carlina acanthifolia, 10 gr. 3 fr.; 5 gr. 2 fr.
» acaulis, 10 gr. 3 fr.; 5 gr. 2 fr.
Ce sont les superbes chardons d'argent qui, l'automne, animent les pentes de nos monts, où ils forment des touffes naines d'une grande beauté.
» vulgaris.
Castilleya angustifolia.
» lutea.
Catananche coerulea.
Cathcartia villosa.
Cedronella triphylla.
Celmisia coriacea (ex Nov. Zeland).
Celsia acaulis.
» betonicæfolia, 10 gr. 1 fr.
» Coromandelica.
» orientalis.
Centaurea alpina.
» axillaris.
» Babylonica.
» cyanus variabilis (bleuet en mélange), 5 gr. 1 fr.
» dealbata.
» deusta.
» lutea.
» macrocephala.
» monantha.
» montana.
» » (à fl. blanches).
» nervosa.
» orientalis (à fl. jaunes).
» præalta.
» Ruthenica à fl. jaune citron.
» uniflora.
Centranthus angustifolius, 10 gr. 2 fr.; 5 gr. 1 fr.
Excellente pour garnir les éboulis pierreux.
» longiflorus.
» ruber *(Valér. rouge des murs)* 10 gr. 2 fr.; 5 gr. 1 fr.
» » à fl. blanches, 10 gr. 2 fr.; 5 gr. 1 fr.
» » atrorubens (rouge sang), 10 gr. 2 fr.; 5 gr. 1 fr.
Les Centranthus ou Valériane des murs sont recommandables comme pl. de haute décoration pour la garniture de platebandes, des grands rochers, des murailles surtout. Elles fleurissent abondamment de juin jusqu'en hiver et font un tableau merveilleux dans un paysage.
Cephalaria alpina, 10 gr. 2 fr.
» leucantha.
» uralensis.
Grandes scabieuses jaunes aux formes architecturales.
Cerastium album.
» alpinum.
» argenteum.
» Biebersteini.
» carinthiacum.

Cerastium chloræfolium.
» columnæ.
» fontanum.
» glaciale.
» glandulosum.
» grandiflorum.
» illyricum.
» lanatum.
» Lerchenfeldianum.
» lineare.
» tomentosum (ex Græcia).
» uniflorum.
» uralensis.
» villosum.
» vulgatum.
Ce sont de petites pl. traînantes aux innombrables fl. blanches formant de solides gazons.
Cerinthe alpina.
» minor.
Chamæmelon caucasicum.
Chamæpeuce casabone.
» diacantha.
Chamænerium latifolium (ex Groënlandia).
Chænostoma polyantha.
» fastigiata.
Cheiranthus Allionii, sorte de giroflée odorante aux fleurs du plus bel orangé, se succédant de Juin à fin Novembre; pl. de grand effet; 10 gr. 2 fr.; 5 gr. 1 fr.
» Allionii grandiflorus.
» Cheiri. (*Giroflée des murs*).
» » var. des jardins, Giroflée jaune ou Violier des murs. Les var. suivantes : Aurora, grandifiora, jaune double, parisienne hâtive, Tom Pouce en mélange, Vulcain et White Gem, à 50 cent. le paquet, 1 fr. le gr.
» Kewensis.
» mutabilis.
» nanus.
Chelidonium Franchetianum.
» laciniatum.
» lasiocarpum.
Chelone barbata, 10 gr. 2 fr. 5 gr. 1 fr.
» » hybrida, 5 gr. 2 fr.
» coloradensis.
» glabra.
Chenopodium Bonus Henricus (Epinard des Alpes) 10 gr. 2 fr.
Cherleria sedoides.
Chicorium Intybus.
» » à fl. blanches.
Chionodoxa Boissieri.
Chrysanthemum alpinum.
» arcticum.
» cappadocium.
» carinatum, Chrysanth. annuel en mélange.
» caucasicum.
» ceratophylloides.
» cinerariæfolium.
» coronopifolium.
» lacustre.
» macrophyllum.
» maximum.
Chrysanthemum uliginosum.
Chrysopsis foliosa.
» villosa.
Chrysosplenium flagelliforme.
» oppositifolium.
Cimicifuga fœtida.
» cordifolia.
» racemosa.
Cineraria aurantiaca.
» campestris.
» maritima.
» suaveolens.
Cirsium Eriophorum.
» Erysithales.
» ferox.
» heretophyllum.
» lanceolatum.
» monspessulanus.
» oleraceum.
» spinosissimum.
Cistus albidus.
» corsicus.
» creticus.
» crispus.
» cyprius.
» incanus.
» ladaniferus.
» ladaniferus × villosus.
» laurifolius.
» monspeliensis.
» purpureus.
» salviæfolius.
» villosus.
Clarkia elegans, fl. pl. en mélange (annuelle), 5 gr. 1 fr.
Claytonia asarifolia.
» parviflora.
» perfoliata.
» sibirica.
» virginiana.
Clematis Buchanani.
» Douglasi (ex America).
» graveolens (fl. jaunes).

Clematis flammula (liane de neige).
» Fremonti.
» integrifolia.
» ligusticifolia.
» montana.
» » var. rosea.
» recta.
» recta purpurescens.
» stans.
» Tangutica.
» tubulosa.
» verticillaris.
» virginiana.
» vitalba.
» viticella.
Clintonia borealis.
» uniflora (ex America).
Cneorum tricoccum.
Cochlearia danica.
Codonopsis lanceolata.
» ovata.
Colletia chilensis.
» sylvestris.
» Tanghu.
» viridiflora.
Collomia grandiflora.
Collusia geoides.
Coluteocarpus reticulatus.
Comarum palustre.
Convallaria majalis *(Muguet)*.
Convolvulus altheoides.
» aureus superbus.
» cantabricus.
» mauritanicus.
» tricolor (annuel), (Belle de jour), 10 gr. 1 fr.
Coreopsis grandiflora, 10 gr. 2 fr.
» lanceolata.
» palmata.
» tripteris.
Coris monspeliensis.
Cornus canadensis.
» florida.
» suecica (Norvège).
Coronilla cappadocica, 10 gr. 4 fr.
» coronata.
» emeroides.
» Emerus.
» montana, 10 g. 2 fr., 5 g. 1 fr.
» varia, 10 gr. 2 fr., 5 gr. 1 fr.
Corrigiola telephiifolia.
Cortusa hirsuta.
» Matthioli.
» » grandiflora.
» pubens.
» villosa.
Corydalis australis.
» bulbosa (cava), 10 gr. 3 fr.
Corydalis cheilanthifolia.
» glauca.
» Halleri.
» lutea.
» nobilis.
» ochroleuca.
» ophiocarpa.
» rupestris.
» solida.
» thalictrifolia.
» tomentella.
» tuberosa (excellente pl. d'ombre), 10 gr. 3 fr.
» vaginans.
Cosmos sulfureus.
Cotoneaster adpressa (espèce naine et de rocaille).
» applanata.
» congesta.
» Davidiana (horizontalis), 10 gr. 1 fr.
» depressa, très nain et rampant.
» Franchetti.
» frigida.
» laxiflora.
» microphylla 10 gr. 1 fr.
» nummularia.
» pannosa, 10 gr. 1 fr.
» sinensis.
» tomentosa, 10 gr. 1 fr.
» vulgaris, 10 gr. 1 fr. Excellents arbustes p. rocailles.
Cotyledon *(Umbilicus)* chrysanthus.
» ciliolatus.
» erectus.
» oppositifolius.
» platyphyllus.
» Sempervivum (Sedum sempervivum).
» spinosus.
» umbilicus.
Crambe cordifolia.
» grandiflora.
» Kotschyana.
» maritima.
» orientalis.
» tatarica.
Crepis aurea.
» blattarioides.
» micrantha.
» montana.
» pygmæa.
» rubra.
» sibirica.
» Terglouensis.
Crocus vernus.
Crucianella stylosa (fl. roses très abondantes).

Crucianella stylosa à fl. carmin.
Crythmum maritimum.
Cuphæa lanceolata.
» miniata.
Cyananthus lobatus.
Cyclamen coum.
» » à fl. blanches.
» hederæfolium.
» » à fl. blanches.
» ibericum.
» latifolium.
» libanoticum.
» repandum.
Cynoglossum nervosum.
Cypella Herberti.
Cypripedium calceolus.
» venticosum.
Cytisus albus.
» argenteus.
» austriacus.
» biflorus.
» capitatus, 10 gr. 1 fr.
Excellent arbrisseau de 1 m. à 1 m. et demi, qui se recouvre de fleurs jaunes pendant une bonne partie de l'année
» filipes (ex. Ins. Canar.).
» Laburnum, 10 gr. 1 fr.
» nigricans, 10 gr. 1 fr.
» radiatus, 10 gr. 1 fr.
(Délicieux petit arbuste bas aux rameaux étalés, propre à garnir les rocailles).
» scoparius.
» sessilifolius.
» Shipkæensis.
» stenopetalus (ex Ins. Canar.)
» supinus.
Daphne alpina.
» altaica.
» caucasica.
» cneorum.
» Gnidium.
» Laureola.
» mezereum, 10 gr. 1 fr.
» » à fl. blanches.
» oleoides.
» Philippi.
» pontica.
» pseudo-mezereum.
» striata.
Datisca cannabina.
Datura stramonium, 10 gr. 1 fr.
Delphinium Ajacis (annuel), var. mélang., 10 gr. 2 fr.
» azureum.
» Belladona.
» Brunonianum.
Delphinium californicum.
» cachemirianum.
» » atropurpureum.
» » à fl. blanches.
» » var. mélangées.
» cardinale.
» caucasicum.
» chinense. Esp. superbe à fl. d'un bleu très pur ; 10 gr. 4 fr.
» conspicuum.
» elatum (type).
» formosum, 10 gr. 3 fr.
» » cœlestinum.
» Geyeri.
» grandiflorum, 10 gr. 2 fr., 5 gr. 1 fr.
» grandiflorum var. album.
» » var. azureum.
» » var. compactum.
» » var. roseum.
» » var. Tom Thumb.
» hybridum, mélange des meilleures variétés, 10 gr. 2 fr., 5 gr. 1 fr.
Delphinium hybridum, fl. pl.
» » Diana, fl. pl.
» » Perfection, fl. pl.
» » "Prince of Wales".
» Lugdunum.
» nudicaule.
» occidentale.
» puniceum.
» Requienii.
» scapulorum.
» sulfureum (Zalil), à fl. jaunes.
» superbissimum.
» Tatsuense.
» Thunbergi.
» tirolense.
» triste.
» trolliifolium.
» vestitum.
Dentaria bulbifera.
Desmodium penduliflorum.
» pinnata.
Dianthus acaulis.
» alpestris.
» alpinus.
» arenarius.
» aridus.
» armeria.
» arvernensis.
» asper.
» atrorubens.
» barbatus (Oeillet des poètes),
» » albus.
» » atrococcineus.

Dianthus barbatus, variétés en mélange.
10 gr. 3 fr.
» bicolor.
» brevicaulis.
» cæsius.
» caesio × Plumarius.
» capitatus, 10 gr. 3 fr., 5 gr. 2 fr.
» carthusianorum. Le joli petit œillet rose vif des pentes sèches, 10 gr. 3 fr., 5 gr. 2 fr.
» caucasicus.
» chinensis, var. en mélange, 10 gr. 2 fr.
» chinensis laciniatus, en mél., 10 gr. 2 fr.
» controversus.
» corsicus.
» crinitus.
» cruentus.
» Cyri.
» deltoïdes, 10 gr. 2 fr.
» albus.
» superbus, 10 gr. 3 fr.

Le D. deltoïdes est une esp. tapissante et naine très florifère et solide, de cult. facile.

» dentosus.
» diadematus.
» Falconeri.
» fimbriatus.
» fragrans, 10 gr. 3 fr.
» Freynii
» frigidus.
» furcatus.
» gallicus, tardif, à parfum suave.
» giganteiformis.
» glacialis.
» glutinosus.
» graniticus.
» Holzeri.
» Hungaricus.
» integer.
» Kamtschaticus.
» Liburnicus.
» monspessulanus, 1 gr. 1 fr.
» montanus, 10 gr. 3 fr., 5 gr. 2 fr.
» neglectus.
» Orestis.
» pallens.
» pelviformis.
» petræus.
» pinifolius.
» Plumarius, 10 gr. 1 fr.

L'une des meilleures pl. à bordure et aussi l'une de celles qui garnissent le mieux les rocs, les sommets des murs, les pentes arides au soleil; flor. prolongée et abondante; fl. très odorantes.

Dianthus Plumarius variété candidus, 10 gr. 2 fr.
» Plumarius var. bicolor, idem.
» Plumarius var. Cyclope, 10 gr. 3 fr.
» Plumarius var. floribundus, 10 gr. 2 fr.
» Plumarius var. grandiflorus, id.
» » » hortensis, idem.
» » » laciniatus, id.
» » » lilacinus, idem.
» » » maximus, idem.
» » » nanus, idem.
» » » robustus, idem.
» » » suaveolens, id.
» » » zonatus, idem.
» » variété à fl. pleines, 10 gr. 5 fr.

Ces variétés d'œillets rampants sont excellentes pour former des bordures, garnir des talus secs et le sommet des murs.

» polycladus.
» puberulus.
» pungens.
» pyridicola.
» Requini.
» Seguieri.
» speciosus.
» spinosus.
» squarrosus.
» Sternbergi.
» striatus.
» subacaulis.
» subfastigiatus
» superbus.
» » var. albus.
» » var. nanus
» sylvaticus.
» sylvestris, 5 gr. 3 fr.
» tener.
» vaginatus.
» » roseus.
» Velenowskyi.
» versicolor.
» virgineus.
» viscidus.
» wimmeri.

Les œillets, surtout dans le groupe des Plumarius, sont excellents pour garnir les lieux arides et ensoleillés; ils se contentent de peu et donnent avec abondance de délicieuses fl.

odorantes; tous s'élèvent facilement de semis.
Dicentra formosa (ex Canada).
Dichondra repens.
Dictamnus albus.
» Fraxinella.
Digitalis ferruginea.
» grandiflora, 10 gr. 2 fr., 2 gr. 1 fr.
» lutea, 10 gr. 2 fr., 5 gr. 1 fr.
» mædia.
» ochroleuca.
» orientalis.
» persiflora.
» purpurea, 10 gr. 2 fr., 5 gr. 1 fr.
» » à fl. blanches.
Ce sont des pl. solides, à flor. prolongée; cult. très facile.
Dimorphotheca aurantiaca, 1 gr. 1 fr.
Dioscoræa caucasica.
» pyrenaica.
Diospyros kaki (type ex Japon).
Diphylleia cymosa.
Dipsacus asper.
Dodecatheon integrifolium.
» Mædia.
» pauciflorum.
» radicatum.
Doronicum austriacum.
» corsicum.
» excelsum.
» hirsutum.
» hybridum.
» Pardalianches.
Dorycnium herbaceum.
» ibericum.
» suffruticosum.
Downingia pulchella (ex America).
Draba affinis.
» aizoides, 1 gr. 1 fr.
» » v. grandiflora.
» alpina.
» altaica.
» arabisans.
» armata.
» athoa.
» aurea.
» » grandiflora.
» australis.
» borealis.
» bronchialis.
» brunifolia.
» cadmea.
» cappadocica.
» carinthiaca.
» chamæjasme.
» contorta.
» corsica.
Draba cuspidata.
» dichranoides.
» Fladnizensis.
» frigida.
» glacialis.
» Haynaldi.
» hispánica.
» incana.
» Johannis.
» Kotschyi.
» lactea.
» lasiocarpa, 1 gr. 1 fr.
» laxa.
» Lereschei.
» longirostra.
» nivalis.
» olympica.
» pycnosperma.
» pyrenaica *(Petrocalis)*, 1 gr. 1 fr. 50.
» repens, 1 gr. 1 fr.
» rigida.
» rupestris.
» Sauteri.
» Scandinavica.
» stellata.
» streptocarpa.
» subamplexicaulis.
» Thomasii.
» tomentosa.
» Traunsteineri.
» tridentata.
» vesicaria.
Dracocephalum argunense.
» austriacum, 5 gr. 3 fr.
» botryoides.
» canariense.
» integrifolium.
» nutans.
» peregrinum.
» » à fl. blanches.
» Ruprechti.
» Ruyschianum, 5 gr. 2 fr.
» speciosum.
» thymifolium.
» turkestanicum.
Dryas Drummondi.
» integrifolia (ex Groënland).
» lanata, 5 gr. 5 fr.
» octopetala *(Dryade)*, 10 gr. 5 fr.
L'une des plus gracieuses pl. tapissantes pour rochers; grandes fl. blanches; semis facile.
Drypis Jacquinianus.
» spinosus.
Echinacea intermedia, 10 gr. 4 fr.
» (Rudbeckia) purpurea, 10 g. 2 f.

Echinacea purpurea nana.
» » splendida.
Les Echinacea sont d'excellentes pl. vivaces à gros capitules rouge carmin, excellentes pour la fleur coupée et fleurissant de juillet en décembre.
Echinops niveus.
» Ritro (chardon bleu sphérique du Dauphiné) récolté en Queyras, 10 gr. 2 fr.
» Ritro Floraire, 10 gr. 2 fr.
» sphærocephalus, 10 gr. 2 fr.
Echium petræum *(Lithospermum petræa)*, 5 gr. 5 fr.
» Bourgeanum.
» Moltkia petræa.
» simplex.
Edelweiss (voir Leontopodium).
Edrayanthus (Hedraeanthus) bosniacus.
» caricinus.
» caudatus.
» croaticus.
» dalmaticus, 1 gr. 1 f.
» dinaricus.
» graminifolius, 1 gr. 1 f.
» Kitaibelii.
» pumilio.
» pumiliorum.
» serpyllifolius.
» tenuifolius, 1 gr. 1 f.
Elaeagnus argentea, 5 gr. 1 f.
Elymus canadensis.
Empetrum nigrum.
Ephedra altissima, 5 gr. 2 f.
» distachya, 5 gr. 3 f.
» fragilis.
» Helvetica, 5 gr. 2 f.
L'une des pl. les plus curieuses de la flore suisse.
Epilobium abyssinicum, 10 gr. 4 f.
Grande pl. à grands fl. carmin très vif.
» alpinum.
» anagallifolium.
» augustifolium.
» » à fl. blanches.
» Fleischeri, 5 gr. 3 f.
» frigidum.
» glabellum.
» Hectori.
» hirsutum, 10 gr. 4 f.
» » à fl. blanches.
» latifolium.
» luteum.
» nummulariaefolium.
» obcordatum.
Epilobium origanifolium.
» pedunculare.
» pubens.
» rosmarinifolium, 10 gr. 3 f.
Excellente espèce propre à garnir les lieux arides, fl. rose et carmin.
Epipactis palustris.
Eranthis cilicica.
» yemalis.
Eremurus altaicus.
» Bungei.
» caucasicus.
» Elwesianus.
» Himalaicus.
» Him-robustus.
» inderiensis.
» Kaufmannicum.
» marginatus.
» multiflorus.
» robustus.
» spectabilis.
» tauricus.
» turkestanicus.
Erica stricta, 10 gr. 5 f.
Bruyère corse arborescente, formant dans le jardin de superbes buissons qui se couvrent de fleurs roses tout l'été ; esp. résistant aux sols calcaires et à nos hivers.
» tetralix.
Erigeron alpinus.
» armeriæfolius.
» aurantiacus.
» caucasicus.
» compositus.
» Coulteri.
» elation.
» elatius grandiflorus.
» flagellaris.
» glabellus, 10 gr. 2 f.
Très voisine de l'aster des alpes.
» glaucus.
» leiomerus.
» macranthus.
» montanensis.
» neo-mexicanus.
» oreganum.
» Philadelphicus.
» pulchellus.
» roseus.
» rupestris.
» salsuginosus.
» speciosus, 10 gr. 2 f.
Excell. pl vivace, à grands capitules lilas foncé autour

d'un disque d'or ; juin-automne.
Eremurus trifidus.
» uniflorus.
» Villarsii.
Erinacea pungens.
Erinus alpinus, 1 gr. 1 f. 50.
» » à fl. blanches.
» hirsutus, 1 gr. 1 f. 50.
» » à fl. blanches.
» hispanicus.
» roseus.
Très jolies petites pl. à semer dans les vieux murs ou les rochers au soleil.
Eriogonum arboreum.
» flavum.
» racemosum.
» umbellatum.
Eriophorum angustifolium.
» latifolium.
» Scheuchzeri.
» vaginatum.
Eriophyllum caespitosum.
Eritrichium nanum (Roi de l'Alpe).
Erodium absinthoïdes.
» amanum.
» cheilanthifolium.
» corsicum.
» daucoides.
» Guicciardi.
» hymenodes, 1 gr. 1 f.
Erodium macradenum, 1 gr. 1 f.
» Manescavi, 10 gr. 5 fr., 5 gr. 3 fr.
L'une des meilleures pl. de roc. fleurissant tout l'été et l'automne. Grandes et belles fl. carmin vif.
» oxyrynchus.
» Romanum.
Erpetion reniforme.
Eryngium alpinum (*Panicaut* ou *Chardon bleu des Alpes*) ; 10 gr. 4 f. ; 5 gr. 2 f.
» amethystinum, 10 gr. 3 f. ; 5 gr. 2 f.
» Bourgati (**Le superbe Chardon bleu des Pyrénées**), 10 gr. 4 f. ; 5 gr. 2 f.
» cæruleum (chardon bleu grec) esp. de gros effet (août-octobre), à semer ou planter dans les sols arides et les pentes ensoleillées ; 10 gr. 2 fr.
» Davosianum (C'est la variété très foncée de l'E. alpinum).
» Florariensis.
» » album.
Eryngium giganteum (chardon bleu du Caucase) ; 10 gr. 2 f.
» maritimum.
» multifida.
» Olivierianum.
» planum (chardon bleu de l'Atlas) ; 10 gr. 2 fr.
» serbicum (vrai), 5 gr. 3 f.
» Spinalba (c'est le superbe et rare chardon bleu des Hautes-Alpes), 10 gr. 5 f.
» tripatitum.
» Zabeli.
Erysimum Allionii (Cheiranthus) ; 10 gr. 2 f. ; 5 gr. 1 f.
Plante excellente à floraison prolongée ; fl. orangé très vif ; parfum suave ; culture extra facile.
» cheiranthoides.
» Helveticum, 10 gr. 2 f. ; à semer dans les talus arides.
» leptophyllum.
» nanum, 10 gr. 2 f.
» ochroleucum.
» odoratum.
» pachycarpum.
» pulchellum.
Très jolie pl. rampante à fl. jaune vif ; floraison prolongée ; cult. facile ; 10 gr. 3 f., 5 gr. 2 f.
» pumilum.
» purpureum.
» Rhæticum.
Erythræa centaurum.
» » albà.
» diffusa.
» gothica.
» latifolia.
» linarifolia.
» littoralis.
» ramosissima.
» Rumelica.
Erythronium Johnsoni.
Eschscholzia aurantiaca.
Plante bisannuelle naine qui se ressème d'elle-même avec abondance et donne toute l'année et jusqu'en hiver de grandes fl. de pavots d'un orangé très vif ; 10 gr. 2 f.
» californica, 10 gr. 2 f.
» » var. alba.
» » » carmin.
» » » cinabre.
» » » glauca.
Eupatorium ageratoïdes, 5 gr. 2 f.
» cannabinum album, 5 gr. 2 f.

Eupatorium serotinum.
» verticillatum.
Euphorbia altissima.
» bimaculata.
» canescens.
» Characias.
» Dendroides.
» Gerardiana.
» Kotschyana.
» Lathyris.
» Myrsinites. Excellente pl. à semer dans les endroits arides et secs ; 10 gr. 2 fr.
» pilosa.
» polychroma.
» robusta.
» songarica.
» spinosa.
» Wulfeni.
Euphrasia lutea.
» minor.
» montana.
Euryangium Sumbul.
Falcaria latifolia.
» Rivini.
Falkia repens.
Farsetia eriocarpa, 10 gr. 4 f., à semer dans les lieux arides.
» triquetra (rare).
Ferula Asa fœtida.
» communis.
» Jaeskeana.
» oopoda.
» Orientalis.
» Tetenema.
Grandes ombellifères au feuillage finement divisé et hautement décoratives.
Festuca alpina.
» flavescens.
» glauca.
» valesiaca.
» violacea.
Petits gazons des montagnes à feuillage fin.
Fragaria Daltoniana.
» indica.
Fraisier retombant, à fl. jaunes.
» mexicana.
» monophylla.
» roseiflora.
Francoa appendiculata.
» sonchifolia.
Frasera speciosa.
Fritillaria askabadensis.
» delphinensis, de la station classique du Queyras, 5 gr. 4 f.
Fritillaria imperialis (couronne impériale).
» Meleagris.
» pallidiflora.
Fumana procumbens.
Funkia cœrulea.
» cordata.
Gagea lutea.
Galanthus nivalis.
Galatella incisa.
Galax aphylla.
Galega officinalis.
» » alta.
» orientalis.
» persica.
Gaillardia aurantiaca.
» grandiflora, 5 gr. 1 f.
Belle pl. vivace à très grandes fl. de soleil, rouge et jaune ; grand effet ; cult. facile.
Galium Mollugo.
» purpureum. Très précieuse pl. d'ornement p. rochers et jardins alpins ; gazon fin, fl. d'un brun noir, 5 gr. 2 f.
» tenue.
Galtonia candicans (Jacynthe du Cap).
Gaura coccinea.
» Lindheimeri. Pl. vivace à longs épis de fl. rose chair, excellente p. la fleur coupée ; 10 gr. 2 f.
Gaya simplex.
Genista ætnensis.
» Andreana.
» anglica.
» cinerea.
» germanica.
» horrida.
» juncea, 10 gr. 1 f.
Le brillant Genêt jaune d'Espagne, l'un de nos meilleurs et plus solides arbustes.
» pilosa.
» radiata, 10 gr. 1 fr.
Petit arbuste nain très propre à décorer les rochers.
» sagittalis.
» sericea.
» sibirica.
» tinctoria.
Tous ces Genêts sont excellents pour garnir les rocailles au soleil. Floraison prolongée, pl. solides.
Gentiana acaulis, 10 gr. 3 fr., 5 gr. 2 fr.
L'une des meilleures pl. des

Alpes; germination lente, mais sûre.
Gentiana alba.
» alpina (vrai), 1 gr. 1 f.
» altaica.
» amarella (annuelle).
» Andrewsi.
» angulosa.
» angustifolia.
» asclepiadea, 1 gr. 1 f.
» » à fleurs blanches.
» austriaca (annuelle).
» barbata.
» bavarica.
» Bigelowi.
» brachyphilla.
» brevidens.
» Burseri.
» campestris (annuelle), 10 gr. 3 f. (à semer dans les gazons des jardins alpins).
» Clusii.
» cruciata, 10 gr. 4 f., 5 gr. 2 f.
» depressa.
» detonsa.
» Favrati.
» Fetisowii.
» Freyniana.
» frigida.
» Frœchlichii.
» Gentianella (Hort. Angl.), 5 gr. 3 f.
» germanica (annuel.), 5 gr. 2 fr.
» glomerata.
» hybrida (straminea × Kesselringi), 5 gr. 2 f.
» imbricata.
» Kesselringii.
» » à fl. blanches.
» Kochiana, 10 gr. 4 f.
» lutea, 10 gr. 2 f., 5 gr. 1 f. 50.
» macrophylla.
» » cyanea.
» mongolica.
» Moorcroftiana.
» nivalis (annuelle), 1 gr. 1 f. 50.
» Olivieri.
» pannonica.
» parryi.
» phlogifolia, 5 gr. 3 f.
» Pneumonanthe.
» Przewaldskyi.
» pumila.
» punctata; 10 gr. 3 f., 5 gr. 2 f.
» purpurea; 10 gr. 3 f., 5 gr. 2 f.
» » alba.
» » nana.
» Regeli.
Gentiana Rocheliana.
» Rostani.
» Saponaria.
Très belle espèce reçue du Canada.
» Sceptrum (ex. Canada).
» septemfida, 1 gr. 1 f.
» » latifolia, 1 gr. 1 f.
» straminea.
» straminea × Tibetica.
» tenella (annuelle), 1 gr. 1 f. 50.
» Tibetica, 2 gr. 1 f.
» Tshiantanica.
» » glomerata.
» triflora.
» uliginosa (annuelle).
» utriculosa (annuelle).
» verna, 1 gr. 1 f. 50.
» » var. à fl. blanches.
» » » azurea.
» » » grandiflora.
» » » atrocœrubea.
» Walujevii.
Geranium aconitifolium (*rivulare*), 5 gr. 2 f.
» albanum.
» albiflorum.
» argenteum, 1 gr. 1 f.
» armænum.
» carolinianum.
» cinereum.
» Endresii.
» Fremonti.
» grandiflorum.
» Grevilleanum.
» Ibericum.
» macrorhizum.
» nepalense.
» nodosum.
» palustre.
» phaeum.
» platyanthum.
» platypetalum.
» pratense.
Excellente plante pour rochers et plates-bandes, fleurissant tout l'été; germe de suite et produit la même année ses belles fleurs bleu violet foncé, 10 gr. 2 f., 5 gr. 1 f.
» Richardsoni.
» sanguineum, 10 gr. 4 f.
» » à fleurs blanches, 10 gr. 5 f.
» sessiliflorum.
» subcaulescens.
» sylvaticum.
» tuberosum.

Gerardia tenuifolia.
Gerbera Abyssinica.
» Jamesoni.
» » var. horticoles.
» Kunzeana.
Geum atrosanguineum, 10 gr. 4 f.
» bulgaricum.
» chilœnse (à fl. rouge très vif).
» coccineum (*idem*), 10 gr. 4 f.
» » grandiflorum, 10 g., 5 f.
» Heldreichii, 5 gr. 3 f.
» heterocarpum, 5 gr. 3 f.
» intermedium.
» laciniatum.
» macrophyllum.
» magellanicum.
» montanum, 5 gr. 3 f.
» M[rs] Bradschaw.
» pyrenaicum, 5 gr. 3 f.
» reptans.
» Rhæticum.
» rivale, 10 gr. 2 f.
» » grandiflorum.
» rubellum.
» triflorum.
» tyrolense.
» Wildenowi.
Gilia coronopifolia, 10 gr. 4 f.
Superbe fl. californienne d'un rouge éclatant.
Gillenia trifoliata, 10 gr. 4 f.
L'une des meilleures et des plus florifères d'entre les pl. vivaces d'ornement, fl. blanc-rosé, gracieusement suspendues sur tiges rouge-brun, mai-sept.
Gladiolus palustris.
Glaucium cappadocicum.
» corniculatum.
» leiocarpum.
» luteum, 10 gr. 1 f.
» rubrum, 10 gr. 2 f.
» tricolor, 10 gr. 2 f.
» » grandiflorum, 10 gr. 3 f.
Glaux maritima.
Globularia bellidifolia.
» cordifolia, 5 gr. 4 f.
» nana.
» nudicaulis, 5 gr. 3 f.
» trychosantha, 5 gr. 3 f.
» vulgaris, 5 gr. 3 f.
Glossocomia Clematidea.
Gnaphalium Leontopodium, 1 g. 1 f. 50.
» norvegicum.
» supinum.
» sylvaticum.
Grindelia cuneifolia, 10 gr. 2 f.
» robusta, 10 gr. 2 f. Composées vivaces à grandet capitules jaunes.
Gutierrezia Euthamiæ.
Gymnolomia multiflora.
Gypsophila acutifolia, 10 gr. 2 f.
» alpicola, 10 gr. 4 fr.
» altissima.
» cerastioides.
» libanotica.
» paniculata, 10 gr., 2 f.
L'une des meilleures pl. p[r] la fleur coupée et l'ornementation des jardins.
» paniculata compacta.
» repens (pl. tombante de grande valeur ornementale p. les rochers), 10 gr. 3 f. 5 gr. 2 f.
» repens var. major.
» Rokejeka.
» scorzoneræfolia, 10 gr. 2 f.
» Steveni.
» transylvanica.
» trichotoma.
Haberba Rhodopensis.
Hablitzia tamnoides.
Hacquetia Epipactis.
Halimodendron argenteum.
Haplocarpha Leichtlini.
Hebenstreitia comosa.
Hedysarum boreale.
» esculentum.
» microcalyx.
» multijugum.
» neglectum.
» obscurum.
» polymorphum.
» Semenowi.
» sericeum.
» sibiricum.
» songaricum.
Heimia salicifolia.
Helenium autumnale.
» Bolanderi.
» Hooperi.
Bonnes pl. vivaces à capitules jaunes.
Helianthella quinquænervis.
Helianthemum alpestre (jaune).
» amabile (carmin), 10 gr. 4 f.
» apenninum (blanc), 10 gr. 2 f.
» atrosanguineum (rouge grenat).
» aurora.
» bicolor (jaune et rouge), 10 gr. 4 f.
» canum (jaune).
» coccineum (rouge ardent).
» cruentum (rouge vif).
» Fumana (jaune), 10 gr. 2 f.

Helianthemum Garibaldi.
» grandiflorum (jaune), 10 gr. 2 f.
» mutabile (de plusieurs teintes), 10 gr. 2 f.
» obscurum (jaune).
» œlandicum (jaune).
» polyfolium (blanc), 10 gr. 4 f.
» rhodanthum.
» roseum (rose clair), 10 gr. 3 f.
» rubrum (rouge sombre).
» salicifolium.
» sulfureum.
» tomentosum (à feuilles blanch. fl. jaun.), 10 gr. 2 f.
» velutinum (jaune).
» vulgare (jaune), 10 gr. 2 f.

Ce sont des pl. à gracieux feuill. persistant, aux fl. nombreuses, se succédant presque toute l'année quand on a soin de couper les tiges après la fleur ; culture très facile. Pl. naines et touffues, excell. pour les rochers et talus arides. Lèvent facilement et rapidement.

Helianthus (Tournesols vivaces).
» ciliaris (ex America).
» Maximilianus (ex America).
» pumilus (ex America).
Helichrysum angustifolium.
» anatolicum.
» antennarium.
» arenarium.
» lanatum.
» odoratum.
» Stoekas.
Heliopsis laevis, 10 gr., 1 fr.
» Pitcherianus.
» scabra.
» "Soleil d'or", 10 gr. 1 fr.

Grandes composées vivaces à fl. jaune orangé.

Helleborus abschasicus.
» atropurpureus.
» corsicus.
» fœtidus.
» niger (Rose de Noël), 10 g. 3 fr.
» orientalis.
» purpurascens.
» viridis.
Heracleum alpinum.
» giganteum, 10 g. 2 fr,
» lanatum (Etats-Unis).
» Lehmannianum.
» Mantegazzianum, 10 gr. 2 fr.

Les gr. de cet Heracleum nous ont été apportées du Caucase en 1892. C'est une bonne pl. viv., propre à isoler dans les pelouses, de culture extrêmement facile et à forte odeur anisée; l'une des meilleures plantes mellifères.

Heracleum montanum.
» orientale.
» pubescens.
» pyrenaicum.
» villosum.
Herniaria glabra.
» hirsuta.
» incana.

L'H. glabra est la meilleure pl. tapissante pour garnir les lieux secs et arides, en plein soleil, les sols maigres et stériles qu'elle recouvre rapidement, 10 g. 5 fr.; 5 gr. 3 fr.

Hesperis matronalis (*Giroflée vivace*).
» » var. candidissima.

La Girarde ou Giroflée vivace est une pl. solide, aux nombreuses fl. violettes, odorantes et qu'on peut utiliser pour garnir les coins arides, les grands rochers, les lieux pittoresques, 10 gr. 1 fr.

» nivea.
» sibirica.
» tristis.
Heuchera glabra.
» purpurascens.
» rubescens.
» sanguinea, 5 gr. 3 fr.

Délicieuse saxifragée des montagnes du Mexique, aux fl. rose vif et se succédant de mai en août.

» sanguinea alba.
» » grandiflora.
» » maxima.
» » splendens.
Hibiscus argentinus.
» militaris.
» » alba.
» palustris.
» roseus.
Hieracium albidum.
» aurantiacum.
» Bormülleri.
» lanatum.
» stoloniflorum.
» villosum.
Hippocrepis comosa.
Homogyne alpina.
» discolor.
» sylvestris.

Honkeya peploides.
Horminum pyrenaicum.
» » splendens.
Houstonia cœrulea.
Hugueninia tanacetifolia, 5 gr. 3 fr.
Hutschinsia alpina. (*Lepidium alpinum*).
Hydrophyllum virginicum.
Hypericum Androsæmum, 5 gr. 3 fr.
» aureum, 5 gr. 3 fr.
» Balearicum.
» calycinum.
» Coris, 1 gr. 1 fr. 50.
» delphicum.
» empetrifolium.
» fragile.
» Gebleri.
» Henryi.
» hircinum.
» Hookerianum.
» hyssopifolium.
» Kalmianum, 5 gr. 2 fr.
» Kotschyanum.
» linarifolium.
» maculatum.
» montanum.
» nummulariæfolium.
» Olympicum, 1 gr. 1 fr.
» Orientale, 5 gr. 2 fr.
» origanifolium.
» patulum, 5 gr. 3 fr.
» perforatum. (Millepertuis).
» poliphyllum.
» prolificum.
» Przewaldskyi.
» ptarmicæfolium, 5 gr. 4 fr.
» pulchrum.
» quadrangulum.
» repens. L'une des meilleures pl. tapissantes, 5 gr. 4 fr.
» reptans.
» Rhodopeum.
» Richeri.
» rumelicum.
» scabrum.
» tomentosum, 5 gr. 2 fr.
» transylvanicum
» uralum.
Hypochæris carpathica.
» Helvetica.
» maculata.
Hyssopus aristatus, 5 gr. 2 fr.
» creticeus.
» officinalis, 10 gr. 2 fr.
L'hyssope, à fl. bleu très foncé, au feuillage fortement aromatique, est une excellente pl. pour les pentes arides et lieux secs, recherchée des abeilles.
Hyssopus officinalis à fl. blanches. 10 gr. 3 fr.
» » à fl. rouges, 10 g. 3 f.
» recticaulis.
» sibiricus.
Iberis commutata.
» gibraltarica, 10 gr. 2 fr.
Belle et bonne pl. à fl. lilas, se succédant pendant une grande partie de l'année.
» Gibraltarica × Tenoreana.
» Jordani.
» jucunda.
» saxatilis.
» semperflorens.
» sempervirens, 10 gr. 3 fr.; 5 gr. 2 fr.
L'une des meilleures pl. à rocailles et bordures; fl. blanc pur, de mai en juillet; effet éclatant.
» sempervirens nana, 5 gr. 3 fr.
» stylosa.
» Taurica.
Impatiens glanduligera.
» noli tangere.
Imperatoria angustifolia.
» Ostruthium.
Incarvillea brevipes.
Incarvillea Delavayi, 5 gr. 2 fr.
(Gloxinia vivace). L'une des meilleures pl. viv. d'ornement que nous ait fourni l'Asie; s'élève facilement de semis.
» grandiflora.
» Olgae.
Inula Aschersoniana.
» acaulis.
» ensifolia, 5 gr. 3 fr.
Belle pl. de rochers à fl. jaunes. (Juin-octobre.)
» glandulosa, 5 gr. 3 fr.
Sorte d'Arnica à très grandes fl. originaire du Caucase.
» grandiflora.
» Helenium (aulnée), 5 g. 2 fr.
Pl. officinale stomachique de grande valeur, appréciée déjà des Romains; belle pl. d'ornement.
» hirta.
» limonifolia.
» macrocephala.
» montana.
» Royleana.
Ipomaca rubro-coerulea.

Iris albida.
» acutiloba (ex Oriens).
» arenaria.
» caucasica.
» Constantinopolitana.
» Douglasiana.
» Fieberi.
» fœtidissima.
» Fontanesi.
» gigantea.
» iberica.
» Junionana (ex Oriens).
» Kumaonensis.
» lævigata (*Kæmpferi*).
» musulmanica.
» orchioides.
» paradoxa (ex Oriens).
» Polakii.
» prismatica.
Iris pseudo-Acorus (Le lis héraldique).
» pyrenaica.
» reticulata.
» sibirica.
» » alba.
» sisyrinchium.
» Suziana superbissima.
» versicolor.
» virginica.
Isatis alpina (vraie, récoltée dans le Haut-Queyras, sa station classique). 1 gr. 1 fr.
» brachycarpa (ex Armenia).
» tinctoria.
Jacaranda mimoseefolia.
Jasione humilis.
» montana.
» perennis.
Jeffersonia diphylla.
Juniperus Cedrus (du Pic de Ténériffe). 5 g. 4 fr.
» communis.
» nana, 5 gr. 2 fr.
» Phœnicea.
» prostrata.
» Sabina, 5 gr. 2 fr.
Kernera saxatilis.
Kitaibelia vitifolia.
Knautia arvensis alba.
Kniphofia (Tritoma).
» caulescens.
» grandiflora.
» Saundersi.
» Tuckyi.
» Uvaria.
Kochia trichophylla.
Lactuca chondrillaeflora.
» perennis.
» » alba.
Lagerstroemia indica.
Lamium album.
Laserpitium gallicum, 10 gr. 3 fr.
» halleri, 10 gr. 3 fr.
» hispidum.
» latifolium, 10 gr. 3 fr.
» peucedanoides.
» siler, 10 gr. 3 fr.
Grandes Ombellifères au feuillage ornemental, propres à semer dans les talus arides pour retenir le sol.
Lasiagrostis Calamagrostis.
Lathyrus alatus.
» heterophyllus.
» incurvus.
» latifolius, 10 gr. 1 fr.
» » à fl. blanc pur, 10 g. 1 fr.
» maritimus.
» neurolobus.
» odoratus (*Pois de senteur*). Collection anglaise en mélange, 10 gr. 2 fr.
» Collection de floraire, mélange, 10 gr. 2 fr.
» pratensis.
» pyrenaicus.
» rotundifolius.
» sylvestris.
Laurentia tenella.
Lavandula abrotanifolia.
» delphinensis, 10 gr. 4 fr.
La vraie lavande du Dauphiné.
» nana compacta.
» officinalis, 10 gr. 4 fr.
» spica.
» Stœkas.
» vera.
» » à fl. blanches.
Leontopodium alpinum (Edelweiss).
Semer dans un sol léger et tenir plutôt seç ; repiquer jeune et cultiver au soleil et dans sol calcaire. Diviser tous les deux ans, 1 gr. 1 fr. 50.
Leontopodium altaicum.
» depaupertum.
» Himalayense.
» japonicum.
» Lindavicum.
» sibiricum.
» sikkimense.
» tibeticum.
» transylvanicum.
Lepachrys columnaris (Obeliscaria).
Lepidium alpinum (*Hutschinsia*).

Lepidipm Auerswaldii.
» stylatum.
Lepigonum rubrum.
Leucanthemum maximum (*Grand marguerite*).
Leucojum æstivum.
Leuzea conifera.
Liatris graminifolia.
» punctata.
» pycnostachya.
» scariosa, 5 gr. 3 fr.
» spicata, 5 gr. 3 fr.
Belles fl. d'ornement vivaces, à fl. roses en épis dressés.
Libertia grandiflora.
Ligularia afghanistanica.
» areneosa.
» calthæflora.
» macrophylla, 5 gr. 2 fr.
» sibirica, 5 gr. 2 fr.
» turkestanica.
Lilium bulbiferum.
» candidum.
» Cataniæ.
» cordifolium (ex Japon).
» croceum.
» dalmaticum.
» Glehni.
» Martagon (excellent pour les sous-bois), 5 gr. 2 fr.
» Martagon à fl. blanches.
» monadelphum.
» pomponium.
» pumilum (ex Sibéria).
» pyrenaicum (Martagon jaune), 5 gr. 3 fr.
» superbum.
« tenuifolium.
» tigrinum.
Linaria alpina, 5 gr. 3 fr.
» » alba.
» concolor.
» » rosea.
» anticaria.
» canadensis
» cilicica.
» cymbalaria.
» » à fl blanches.
» » var. compacta.
» dalmatica.
» genistifolia (le vrai).
» italica.
» macedonica.
» origanifolia.
» pallida, 1 gr. 1 fr.
» » rosea.
» Pancicii.
» petræa (voisin d'alpina).
Linaria pilosa.
» purpurea.
» spuria.
» striata.
» triornitophora (superbe espèce portugaise).
» tristis.
Lindelofia spectabilis, 5 gr. 1 fr. (*Myosotis d'Orient*).
Jolie et solide Boraginée à fl. bleu foncé.
Linnæa borealis.
» canadensis (ex Canada).
Linum alpinum.
» campanulatum.
» capitatum.
» catharcticum.
» flavum, à fl. jaune pâle, très beau, excellent pour rochers ensoleillés et bonne fl. vivace pour fl. coupée, 10 gr. 3 fr,; 5 gr. 2 fr.
» grandiflorum (à fl. rouge vif).
» maritimum.
» narbonense.
Le meilleur de tous; grandes fl. bleues, à pétales persistantes.
» perenne, 10 gr. 2 fr.
» » à fl. blanches, 10 g. 2 f.
» » à fl. roses.
Le L. perene est l'une des meilleures pl. d'ornement pour platebandes et grands rochers, au soleil; fl. bleu d'azur, très abondantes, de mai en novembre. Culture des plus faciles.
» salsoloides.
» tenuifolium.
» viscosum à fl. rose tendre.
Lithospermum Froebeli.
» fruticosum.
» Gastonis.
» graminifolium, 1 gr. 1 fr.
» intermedium. 1 gr. 1 fr.
» oleoides.
» petræum (Echium ou Moltkia petræa), 1 g, 1 fr.; 5 g. 4 fr.
» prostratum.
» purpureo-cœrulum.
» Sibthorpianum.
Lloydia serotina.
Lobelia cardinalis, (vrai).
» fulgens.
» Gerardi.
» Kalmii.
» Kamtschatica.
» linnaeoides.

Lobelia Lugdunensis.
» speciosa,
» syphilitica, 5 gr. 5 fr.
Lonicera alpigena.
» cœrulea, 10 gr. 2 fr.
» etrusca.
» nigra, 10 gr. 2 fr.
» pyrenaica (vrai), 10 gr. 2 fr.
Lotus corniculatus.
Luhea divaricata (ex Chili).
Lunaria rediviva.
Luzula albida.
» » rubra.
» nivea.
» parviflora (ex Groenland).
Lychnis alpina, 2 gr. 1 fr.
» » à fl. blanches.
» chalcedonica (Croix de Malte), 10 gr. 2 fr.
» chalcedonica alba, 5 gr. 2 fr.
» » rosea.
» flos Jovis (*Fl. de Jupiter*), 5 gr. 2 fr.
» » à fl. blanches.
» fulgens.
» Haageana.
» Lagascæ (*Petrocoptis Lagascœ*).
» Laponica.
» viscaria, 5 gr. 2 fr.
Jolie Carophyllée rose carmin vif, facile à élever de graines.
» viscaria alba.
» » rosea.
» » splendens, 5 gr. 2 fr.
Lynosiris punctata.
» vulgaris.
Lysimachia atropurpurea.
» clethroides.
» dahurica.
» dubia, 5 gr. 2 fr.
» ephemerum.
» japonica.
» kindigeri.
» lobelioides.
» punctata.
» quadrifolia, 5 gr. 2 fr.
» thyrsiflora.
» verticillata, 5 gr, 2 fr.
» vulgaris, 5 gr. 2 fr.
Plante propre à garnir les lieux humides et dont plusieurs (dubia, punctata, verticillata) sont également de bonnes pl. vivaces, à grand effet, grâce à leurs grands panicules d'innombrables fl. jaune vif ou blanc rosé.

Lythrum Salicaria, 5 gr. 2 fr.
Excellente pl. pour les lieux humides.
Macrotys actaeoides.
Malva Alcea.
» « alba.
» moschata.
» » alba.
Malvastrum lateritium.
» limense.
Mamillaria vivipara.
Mandragora officinalis.
Margyricarpus setosus.
Marrubium candidissimum.
» cyllaneum.
» Kotschyi.
» lanatum.
» sericeum.
» spinulosum.
» velutinum.
Matthiola fenestralis.
» fragrantissima.
» incana type.
» » var. (Giroflées en variétés).
» » var. Augusta-Victoria.
» odoratissima (ex Oriens).
» rupestris.
» sinuata.
» tristis.
» valesiaca.
Mayanthémum canadense.
Meconopsis aculeata.
» cambrica 5 gr. 4 fr.
(Pavot jaune des bois). Cette pl. est excellente pour les lieux frais et ombragés.
» cambrica à fl. orangées.
» » à fl. pleines.
» heterophylla.
» integrifolia.
» nepalensis.
» paniculata
» petiolata.
» racemosa.
» simplicifolia.
» sinuata latifolia.
» Wallichiana.
Medicago Echinus. (Pl. de la Passion), feuilles maculées de sang).
Melandrium rubrum (Lychnis des prés alpins), 10 gr. 3 fr.
» affine (ex Groenland).
Melica altissima.
» atropurpurea.
» ciliata.
» nutans.
» uniflora.

Melissa officinalis (Mélisse), 5 gr. 1 fr.
Mertensia ciliata.
» echioides.
» lanceolata.
» oblongifolia.
» paniculata (*sibirica*).
» » à fl. blanches.
» primuloides.
Meum athamanticum, 10 gr. 2 fr.
L'une des plus fines verdures qu'on puisse imaginer.
Meum Mutellinum.
Michauxia campanuloides.
Micromeria rupestris.
Mimulus alsinoides
» cardinalis.
Le M. cardinalis a les fl. rouge vermillon.
Mimulus cardinalis de couleurs variées.
» Lewisii (ex Canada).
» luteus.
Mirabilis multiflora.
Mitchella repens.
Mitella diphylla.
» pentandra.
Mœhringia ciliata.
» Jankæ.
» muscosa.
» papulosa.
» pendula.
» Ponae.
Monarda dydima.
» » alba.
» fistulosa (thé d'Oswego).
» florariensis.
» Kalmiana.
» purpurea.
» stricta.
» superba.
Molospermum cicutarium.
Molucella spinosa.
Moraea iridioides.
Morine longifolia, 10 gr. 2 r.
» persica.
Muhlenbeckia nana.
Mulgedium alpinum, 1 gr. 1 fr.
» Bourgæi, 1 gr. 1 fr.
» plumieri, 1 gr. 1 fr.
Grandes laitues vivaces à fl. lilas bleu.
Myosotis alpestris (fl. bleu pur). 5 gr. 2 fr.
» cæspitosa.
» lithospermifolia.
» palustris, bleu d'azur, 5 gr. 3 fr.
Myosotis palustris, var. « perfection ».
» var. semperflorens.
« pygmaea.
Myosotis rupicola.
» Welwitchii.
Myriactis Wallichii
Myricaria (Tamarix) germanica.
Myrrhis odorata.
La Myrrhe, dont les racines sont fortement anisées.
Nardus stricta.
Nepeta lanceolata.
» macrantha.
» Nepetella.
» nuda.
» Tibetica.
Nuphar luteum (*Nénuphar jaune).* 5 gr. 2 fr.
Nymphæa alba (*nénuphar blanc*), 5 g. 2 fr.
Obeliscaria pulcherrima.
Œnothera acaulis.
» arguta.
» caespitosa.
» densiflora.
» Fraseri (fruticosa), 5 gr. 3 fr.
» macrocarpa (*O. Missouriensis*).
L'une des meilleures plantes de rocailles ; grandes fl. jaune clair, de juin en novembre : culture facile ; 10 gr. 2 fr.
» pumila.
» rosea.
» rosea mexicana.
» serrulata.
» speciosa.
Omphalodes cappadocica.
» linifolia (annuel).
» Luciliæ.
» » à fl. blanches.
» nitida.
Onobrychis laconica.
» montana.
Ononis cenisia, 5 gr. 2 fr.
» fruticosa.
» natrix, 10 gr. 1 fr.
» rotundifolia, 10 gr. 2 fr.
Onopordon bracteatum.
Onosma armena.
» albo-rosea.
» Bourgæi.
» Cassium.
» Helveticum, 5 gr. 3 fr.
» pallida.
» poliphyllum.
» rupestris.
» stellulatum, 5 gr. 3 fr.

Opuntia albospina[1].
» arborescens.
» arkansana.
» Camanchica, 5 gr. 2 fr.
» » major, 5 gr. 2 fr.
» cantabrigensis.
» cymochila, 5 gr. 2 fr.
» fulgens (à fl. rouge vif).
» gigantea, 5 gr. 2 fr.
» greenii, 5 gr. 2 fr.
» macrorhiza, 5 gr. 2 fr.
» mesacantha, 5 gr. 2 fr.
» missouriensis, 5 gr. 2 fr.
» orbicularis.
» Raffinesquiana, 5 gr. 2 fr.
» rubra, 1 gr. 1 fr.
» Salmonea (fl. rouge saumon).
» spinacantha, 2 gr. 1 fr.
» vulgaris.
» Xanthostemma rosea.
Origanum pulchrum.
Orobus lathyroides.
» luteus.
Orobus niger.
» tuberosus.
» vernus.
Ostrowskya magnifica.
Othonna cheirifolia.
Oxalis acetosella.
» » rosea.
» atrosanguinea.
» enneaphylla.
Oxybaphus nyctaginus.
Oxyria digyna.
» elatior.
Oxytropis Baïkalensis, 5 gr. 3 fr.
» campestris, 5 gr. 3 fr.
» Halleri, 5 gr. 3 fr.
» Lapponica.
» ochroleuca.
» Pallasi.
» pilosa.
» sordida.
» spicata.
» sulfurea.
» Tyrolense.
Pachystigma Cambyi (ex Canada).
Paeonia albiflora.
» anomala.
» coralina.
« decora (Romanica), 10 gr. 2 fr. fl. couleur vermillon très vif.
Paeonia decora major.
« lutea, 10 gr. 5 fr.
» officinalis, 10 gr., 2 fr.
» Pallasi.
» peregrina.
« Russi.
» » alba.
» tenuifolia.
» triternata, 10 gr. 3 fr.
» Witmanniana.
Palafoxia mexicana.
Pancratium maritimum.
Papaver alpinum, 10 gr. 6 fr.
» alpinum, var. à fl. rouge vif, rouge cinabre, rose et jaune. Ces pavots alpins sont d'entre les plus florifères, les plus gracieuses et les meilleures des pl. de roc. Leurs fleurs, très abondantes, affectent toutes les teintes. On peut les semer dans les rochers, les graviers, les fentes de murs et les lieux pierreux. Sol maigre et rocailleux.
Papaver alpino-nudicaule.
» atlanticum.
» bracteatum *(involucratum)*.
» Burseri.
» caucasium.
» croceum.
» "Croix helvétique".
« Heldreichii.
» Kerneri.
» maximum.
» monanthum.
» nudicaule, 10 gr. 4 fr.
» » à fl. blanches.
» » » jaune vif.
» » » rouge cramoisi.
» » Toutes teintes mélang.
Le pap. nudicaule est l'une des plus florifères et des plus précieuses d'entre les plantes alpines ou vivaces. Il aime la fraîcheur et la mi-ombre et constitue l'un des meilleurs ornements des rochers. Fleurit tout l'été et jusqu'en hiver, très facile à cultiver; bon pour la fl. coupée.
» oreophyllum.

[1] Ces Opuntia sont des Cactées dont les graines lèvent facilement et qui sont rustiques à nos hivers. Il suffit, dans les pays du Nord, de tenir les plantes au sec (recouvertes de planches inclinées) pendant la mauvaise saison. Elles fleurissent abondamment l'été si l'on a soin de les planter au grand soleil. En Allemagne, on en cultive de grandes collections sans même les recouvrir de planches.

Papaver orientale, 10 gr. 2 fr.
» » variétés en mélange, 10 gr. 3 fr.
Le pavot d'Orient est la plus éclatante de nos fleurs de pl. terre. Sa grosse corolle d'un rouge ardent fait un effet grandiose dans les jardins. Culture facile. On en possède de nombreuses variétés, mais, comme les semis varient beaucoup, nous préférons les offrir en mélange plutôt que de tenir les variétés de graines séparées.
» persicum.
» pilosum.
» pyrenaicum.
» radicatum.
» Rhæticum (de la Bernina).
» splendidissimum.
» strictum.
» strigosum.
» tauricolum.
» triniaefolium.
Paracarium azureum.
Paradisia Liliago.
» Liliastrum. Lis de Saint-Bruno facile à élever.
» Liliastrum major.
Pardanthus chinensis.
Paris quadrifolia.
Parnassia alpina.
» asarifolia.
» fimbriata (ex Canada).
» mysorensis.
» palustris.
Paronychia argentea.
» Kapellae.
» nivea.
Parrotia persica.
Parrya Menziesii.
Pastinaca aureo-reticulata (à fl. panachées en échiquier).
Patrinia heterophylla.
» palmata (triloba).
» rupestris. Très belle valériane à fl. jaune vif, de grand effet et de culture facile, 5 gr. 2 fr.
» scabiosæfolia.
Pedicularis atrorubens.
» cenisia.
» foliosa.
» palustris.
» recutita.
» retroflexa.
» tuberosa.
Pedicularis verticillata.
Pl. semi-parasites à semer avec du gazon.
Peganum Harmala.
Pelargonium Endlicherianum.
Peltaria alliacea, 5 gr., 2 fr.
Penthorum sedoides.
Pentstemon acuminatus.
» albus.
» alpinus.
» antirrhinoides.
» arizonicus.
» atropurpureus.
» Bradbury.
» Bridgesi.
» cæruleus.
» carinatus.
» Cobœa.
» confertiflora.
» confertus.
» cyananthus.
» diffusus (ex Canada).
» » (Floraire), 10 g. 3 fr.
» digitalis. Excellente pour la fl. coupée; fl. blanc opalin, 10 gr. 3 fr.
» gentianoides
» glaber, 5 gr. 3 fr.
» glaucus, 5 gr. 2 fr.
» Gordoni splendens.
» gracile.
» gracilentus.
» heterophyllus
» humilis, jolie pl. alpine aux fl. d'un bleu de Gentiane, 1 g. 1 f.
» hybridus hortensis (les meilleures variétés des jardins; excellentes pl. de décoration).
» Jamesi, 1 g. 1 fr.
Pentstemon lævigatus, 10 gr. 3 fr., fl. blanc lilacé.
» latifolius,
» linarioides, 1 gr. 1 fr.
» Menziesii.
» » type canadian, bas et rampant (ex Canada).
» Murrayanus grandiflorus.
» ovatus, 5 gr. 2 fr.
» procerus.
» pubescens, 5 gr. 2 fr.
Fl. très nombreuses, de teinte opale se succédant tout l'été, excellent pour la fleur coupée.
» puniceus.
» pygmaeus.
» rubricaulis.
» scouleri 1 gr. 1 fr.
» speciosus.

Pentstemon spectabilis.
» venustus, 5 gr. 2 fr.
» virgatus.
» Watsoni.
» Wrightii.
Les Penstemon sont les Digitales de l'Amérique du Nord; ce sont de bonnes pl. vivaces de plates-bandes ou de rochers qui fleurissent longtemps et sont très ornementales. On ne saurait trop en vanter la rusticité et la longue floraison; leurs fl. sont d'entre les meilleures pour les bouquets. Il en est dont les teintes bleu d'azur rappellent les gentianes des Alpes.
Pericome caudata.
Petalostemon candidus.
» tenuifolius.
Petasites albus.
» niveus.
» palmatus (Canada).
Petrocoptis Lagascæ.
Peucedanum angustifolium.
» Austriacum.
Phaca alpina, 5 gr. 2 fr.
» astragalina (Astragalus alpinus), 5 gr. 3 fr.
Phacelia tanacetifolia.
Phleum alpinum.
Phlomis alpina.
» Samia.
» tuberosa.
Phlox acuminata.
» decussata, les meilleures variétés des jardins en mélange; 10 gr 2 fr.
» Douglasi.
» fruticosa.
» maculata.
Phygelius capensis, 5 gr. 4 fr. Curieuse pl. vivace à fl. rouge cocciné.
Physalis alkelengi (Akékenge ou Coqueret), 5 g. 1 fr.
» Franchetti.
Physochlaina orientalis.
Physostegia virginiana, 10 gr. 2 fr.
Très jolie pl. vivace avec de longs épis de fl. d'un rose tendre; juillet-octobre.
» » à fl. blanches.
Phyteuma austriaca.
» betoniæfolium.
» canescens, 5 gr. 2 fr.
» carestiæ, 5 gr. 2 fr.

Phyteuma charmeli.
» comosum.
» corniculatum.
» globulariæfolium.
» hemisphæricum, 1 gr. 1 fr.
» humile.
» nigrum.
» orbiculare, 2 gr. 1 fr.
» pauciflorum.
» repandum.
» Scheuchzeri.
» Scorzonerifolium.
» serratum.
» Sieberi.
» spicatum, 5 gr. 3 fr., pl. d'ombre.
Pinguicula alpina.
» grandiflora.
» longifolia.
» Reuteri.
» vulgaris.
Pinus Cembro (Arolle).
Plagius ageratifolius.
Plantago alpina.
» argenta.
» asiatica.
» Cynops, à semer en terrains arides, 10 gr. 2 fr.
» montana.
Platycodon grandiflorum. (Campanule à grande fleur), 10 gr. 2 fr.
» » à fl. blanches. 10 gr. 5 fr.
» » à fl. doubles.
» Mariesi, 10 gr. 2 fr.
» » à fl. blanch., 10 g. 2 f.
» » grandiflora.
Ce sont les superbes campanules japonaises, aux grandes fl. fraîchement découpées et vivement colorées en bleu intense, blanc, opale ou azur. Très rustiques, très florifères (juillet-octobre), ce sont des pl. de grand effet et de premier ordre pour la décoration des platebandes et rochers.
Podophyllum Emodi.
» peltatum.
Poincianna Gillesii.
Polemonium cœruleum, 10 gr. 2 fr.
Pl. mellifère, éminemment propre à orner un jardin; fl. bleues très odorantes et se succédant sur la pl. de juin à septembre.
» cœruleum album. 10 g. 2 fr.
» Berninæ.

Polemonium filicinum.
» flavum.
» flavo-cœruleum.
» foliossissimum.
» grandiflorum.
» humile.
» Himalayense.
» molle.
» pauciflorum.
» pulchellum.
» reptans.
» Richardsoni.
» scapulorum.
» Tanguticum.
Les Polémoines sont d'admirables pl. viv., formant de jolies touffes d'une verd. fine et gaie, et portant de beaux panicules de fl. bleues, blanches ou jaunes odorantes.
Polygala anatolica.
Polygala chamæbuxus, 5 gr. 4 fr.
» Varedæ.
Polygonatum giganteum.
» multiflorum.
» verticillatum.
» vulgare.
Polygonum alpinum.
» amplexicaule.
» Baldschuanicum, 10 gr. 3 fr.
» Bistorta, 10 gr. 4 fr.
» » v. angustifolia.
» Brunonis.
» capitatum.
» Emodi.
» sphaerostachyum.
» ussuriense.
» viviparum.
» Weyrischii.
Potentilla adjarica.
» alchemilloides.
» alpestris.
» ambigua.
» argentea.
» argyrophylla.
» atrosanguinea, 5 gr. 2 fr.
Fl. d'un rouge sanguin foncé; pl. décorative et bonne pour fl. coupées.
» aurea.
» Baldensis.
» bifurca.
» caucasica.
» caulescens.
» chinensis.
» chrysantha, 10 gr. 4 fr.
Jolie fl. jaune clair.
» Clusiana.

Potentilla crinita.
» delphinensis.
» Engadinensis.
» Fenzlii.
» fragiformis.
» Friedrichseni.
» frigida
» fruticosa *(Potentille en arbre)*.
» fulgens.
» glandulosa.
» gracilis.
» grandiflora.
» Hippiana.
» Hookeriana.
» Hortensis (var. hortic. mélang.)
» incanescens.
» Kurdica.
» Langeana (ex Groënland).
» Lapponica.
» Leopolina.
» Levieri.
» montenegrina.
» mooniana.
» multifida.
» Nepalensis, 5 gr. 2 fr.
Superbe esp. à fl. rose tendre veinées de carmin.
» nitida.
» nivalis.
» nivea.
» pedemontana.
» peduncularis.
» petiolulata.
» pulcherrima.
» pyrenaica.
» Ranunculus (ex Groënland).
» recta.
» rupestris (fl. blanch.), 2 gr. 2 fr.
» Salesowiana.
» sanguisorbæfolia.
» Saxifraga.
» sibbaldi.
» speciosa.
» » discolor.
» tanacetifolia.
» taurica.
» Tormentilla.
» Transcaspiensis.
» tridentata.
» tuberosa.
» Vahli (ex Groënland).
» valderia.
» viscosa.
» Visiani.
» Willmottiana.
Pratia angulata.
Prenanthes purpurea.

Primula acaulis.
» » var. à fl. bleu foncé.
» » var. orientalis.
» admontensis.
» algida.
» Allionii.
» angustidens.
» Arctotis.
» Auricula (type alpin). 5 g. 4 f.
» » var. horticoles.
» » marginata.
» » pallida.
» auriculata.
» Balbisii.
» Beesiana.
» bella.
» Bellunensis.
» Berninæ.
» Bulleyana.
» capitata (vrai, bleu foncé).
» capitellata.
» carniolica.
» carpathica.
» cashmeriana.
» » à fl. blanches.
» » grandiflora.
» ciliata.
» Cockburniana.
» commutata.
» cortusoides.
» Cottia.
» crenata.
» darialica.
» decipiens.
» denticulata.
» » var. à fl. blanches.
» discolor.
» elatior.
» farinosa.
» floribunda (non rust. chez nous).
» Forbesi.
» Forresti.
» Freynii.
» frondosa.
» glaucescens (calycina).
» grandis.
» Heucherifolia (Gagnepainii).
» hirsuta (très belle esp. à fl. carmin), 5 gr. 4 fr.
» integrifolia.
» intricata.
» Isabellina.
» japonica, 2 gr. 2 fr.
L'une des plus robustes, les hampes florales portent plusieurs étages de fl. du carmin le plus vif. Elle aime l'humidité.
» japonica à fl. blanches.

Primula japonica à fl. pourpre foncé.
» » picta.
» Juliae.
» kewensis.
» latifolia (graveolens).
» leucophylla.
« Lishangiensis.
» Littoniana.
» longiflora.
» luteola.
» macrocalyx.
» magellanica.
» malacoides.
» marginata.
» megasæfolia.
» mollis.
» monacensis.
» muscarioides.
» obovata.
» officinalis.
» patens.
» pedemontana.
» Poissoni.
» Portæ.
» pseudo-Sikkimensls.
» pubescens.
» pulveralenta, 5 gr. 4 fr., 2 gr. 2 fr.
» rosea, 1 gr. 1 fr. 50.
Du rose le plus vif qui se puisse rêver.
» rosea grandiflora.
» saxatilis.
» scottica.
» Sieboldi.
» Sikkimensis.
» spectabilis.
» suaveolens.
» variabilis (var. anglaises), mélange.
» superbe, 5 gr. 2 fr.
» Veitchi.
» venusta.
» veris (les meilleures var. anglaises), 5 gr. 2 fr.
» » à fl. bleues.
» verticillata.
» villosa.
» viscosa, 5 gr. 4 fr. (P. *hirsuta*).
La jolie Primevère carmin des Alpes granitiques.
» viscosa alba.
» hybrida.
» vittata.
» Warei.
» Wulfeniana.
Prunella alba.
» grandiflora ; 5 gr. 3 fr.

Prunella grandiflora purpurea.
» incisa rubra, couleur rouge.
» laciniata, 5 gr. 3 fr.; superbe.
Prunus prostrata.
Psoralea bitumimosa.
» macrostachya.
Pterocephalus (*scabiosa*) Parnassi.
Pulmonaria rubra.
Putoria calabrica.
Pycnanthemum lanceolatum.
Pyrethrum achillæfolium.
» argenteum.
» corymbosum.
» densum.
» macrophyllum.
» roseum.
» sericeum.
» Tschihatscheffi.
Pyrus nigra (Petit arbuste de rocaille à feuillage rougissant l'automne), 10 gr. 2 fr.
Ramondia pyrenaica.
» » rosea.
» serbica.
Ranunculus aconitifolius, 10 gr. 2 fr. Excellent pour les lieux frais et ombragés.
» alpestris.
» amplexicaulis.
» anemonoides.
» Baldshuanensis.
» bilobus.
» caucasicus.
» Constantinopolitanus.
» crenatus.
» creticus.
» glacialis, 1 gr. 1 fr.
» graminæus, 5 gr. 2 fr.
» hybridus.
» Illyricus.
» Lyalli (ex Nov. Zéland.).
» millæfoliatus.
» monspessulanus.
» montanus.
» orthorhynchus (ex Canada).
» parnassifolius, 2 gr. 1 fr.
» platanifolius.
» pygmaeus.
» pyrenæus, 5 gr. 2 fr.
» rutæfolius.
» Seguieri.
» serbicus.
» Thora, 5 gr. 2 fr.
Rehmania angulata.
Reseda complicata.
» fruticulosa.
» virgata.
Rhamnus pumila.
Rhaponticum cinarioides, 10 gr. 2 fr.
» Heleniifolium, 10 gr. 2 fr.
» pulchrum.
Rhazia orientalis.
Rheum caspicum.
» Collinianum.
» corallinum.
» Emodi.
» officinale.
» palmatum.
» tataricum.
» Wilsonianum.
Rhodiola linifolia.
» rubra.
» rosea (*Sedum Rhodolia*).
Rhododendron chamæcistus.
» ferrugineum (*La Rose des Alpes*)
» ferrugineum à fl. blanches.
» hirsutum.
» intermedium.
» Kamtschaticum.
» lapponicum (ex Groënland).
» myrtifolium.
Rodgersia æsculifolia.
» tabularis.
Rodhea japonica.
Romanzoffia Sitchensis.
Romneya Coulteri.
Roripa pyrenaica.
Rosa alpina (*Eglantine des Alpes*). 10 gr. 1 fr.
» Fortunei.
» dumetorum, 10 gr. 1 lr.
» microcarpa.
» multiflora, 10 gr. 1 fr.
» pimpinellifolia (*Eglantine blanche des Alpes*), 10 gr. 1 fr.
» rugosa, 10 gr. 1 fr.
» rubiginosa (Sweet bryar), 10 gr. 1 fr.
Rosmarinus officinalis.
» prostratus.
Rubia peregrina.
Rubus arcticus.
» chamæmorus (Norwège).
» laciniatus.
» leucodermis.
» saxatilis.
Rudbeckia ampla.
» bicolor.
» californica, 10 gr. 2 fr.
» conspicua, 10 gr. 2 fr.
» flava, 10 gr. 2 fr.
» fulgida, 10 gr. 2 fr.
» » vass., 10 gr. 2 fr.
» hirta, 10 gr. 2 fr.
» » var. hungarica, pl. naturalisée en Hongrie.

Rudbecka intermedia, 10 gr. 3 fr.
» laciniata, 10 gr. 2 fr.
» Neumanni.
» nitida.
» » *Autumn glory.*
» occidentalis.
» purpurea, 10 gr. 2 fr.
» » grandiflora, 10 gr. 3 fr. Excellente pour la fl. coupée.
» purpurea nana.
» » splendens, 10 gr. 3 fr.
» pinnata.
» subtomentosa.
Les Roubecques sont d'entre les meilleures et les plus précieuses des pl. vivaces ; leurs fleurs, très apparentes, en capitules jaune et noir chez la plupart, rouge sombre ou carmin chez intermedia purpurea, durent longtemps et sont excellentes pour la fleur coupée. Culture des plus facile.
Ruellia ciliosa.
Rumex alpinus.
» flexuosus (feuillage brun foncé).
» hydrolapathum.
» venosus.
Ruscus aculeatus.
» racemosus.
Ruta angustifolia.
» graveolens, 10 gr. 1 fr.
» patavina.
Sagina Linnæi.
» subulata.
Salix reticulata.
» retusa.
Salvia æthiopis.
» argentea.
» azurea, 2 gr. 1 fr.
» » grandiflora, 2 gr. 1 fr. 50.
» » » alba.
» Bertoloni.
» candelabrum.
» cypria.
» exigua.
» globosa.
» glutinosa (sauge à fl. jaunes).
» Horminum (bractées colorées).
» mellifera.
» officinalis.
» » major.
» » à fl. blanches.
» pratensis.
» » à fl. blanches.
» » à fl. roses.
» » bicolor.
Salvia ringens.
» scabiosæfolia.
» Sclarea.
» verbascifolia.
» verticillata alba.
Samolus Valerandi.
Sanguinaria canadensis.
Sanguisorba canadensis.
» Vallistellinæ.
Sanicula europaea.
» Marylandica.
Santolina chamæcyparissus.
» pectinata.
» rosmarinifolia.
Saponaria bellidifolia (à fl. jaunes), 5 gr. 2 fr.
» cæspitosa.
» glutinosa.
» lutea, 5 gr. 4 fr.
» ocymoides, 5 gr. 2 fr.
» » v. splendens.
Le sap. ocym. est l'une des meilleures des pl. de rocailles ; elle croît au soleil, retombe gracieusement et se recouvre, en mai-juillet, de nombreuses fl. roses.
» officinalis.
» pulvinaris.
Sarcocapnos speciosa (*Corydale à fl. roses*).
Sarothamnus scoparius.
Sarracenia purpurea.
Satureya diffusa.
» intermedia.
» montana, l'une des meilleures pl. pour garnir les lieux secs et stériles (mellifère), 10 gr. 2 fr.
» pygmæa.
» repanda.
Saussurea albescens.
» alpina.
» decurrens.
» depressa.
» discolor.
» pymæa.
Saxifraga aizoides, 5 gr. 3 fr.
» » var. atrorubens.
» Aizoon, 5 gr. 3 fr.
» » à fl. rose vif.
» ajugæfolia.
» Alberti.
» Allionii, tapissante et très basse.
» altissima.
» ambigua.
» anceps.

Saxifraga androsacea.
» aphylla.
» apiculata.
» aquatica.
» arachnoidea.
» aretioides.
» aspera
» atropurpurea.
» augustana.
» australis.
» Bertoloni.
» biflora
» blepharophylla.
» Boryi.
» » major.
» brevifolia.
» bronchialis.
» Brunoniana.
» bryoides.
» bulbifera.
» Burseriana.
» cæsia.
» cæspitosa, 5 gr. 4 fr.
» californica.
» Camposii.
» canaliculata.
» capitata.
» carinthiaca.
» carniolica.
» carpathica.
» cartilaginea.
» catalaunica.
» ceratophylla.
» cernua.
» cervicornis.
» chrysoplenifolia.
» circuenta.
» cochlearis, 5 gr. 4 fr.
» coniferæe.
» controversa.
» coriophylla.
» Cotyledon.
» Cotyledon × aizoon.
» Cotyledon angustifolia.
» crustata.
» » major.
» cuneata.
» cuneifolia.
» Cymbalaria (annuel à fl. jaunes).
» cymosa
» decipiens, 1 gr. 1 fr. 50.
» demissa.
» diapensioides.
» diversifolia.
» elatior.
» erosa.
» exarata.
» Facchini.

Saxifraga Ferdinand-Coburgi.
» flagellaris.
» flavescens.
» florulenta.
» Forbesi.
» Fortunei
» Friedrich-Augusti.
» Gaudini.
» gemmifera.
» geranioides.
» Geum, 5 gr 3 fr.
» Gibraltarica.
» globulifera.
» gracilis.
» granulata.
» » × decipiens.
» Grisebachii.
» Guilford seedling.
» Hausmanni.
» hederacea.
» Hedræantha.
» heucherifolia.
» Hieracifolia
» Hirculus, 1 gr. 1 fr. 50.
» » var. grandiflora.
» Hostei.
» Huetti.
» hypnoides.
» intacta.
» intricata.
» Iratiana.
» irrigua.
» Islandica.
» juniperina.
» Kinlayi
» Kolenatiana.
» Labradorica.
» lævis.
» Lantoscana.
» lasiophylla.
» latepetiolata.
» leucanthemifolia.
» lingulata (vrai).
» longifolia (vrai), 5 gr. 6 fr., 1 gr 1 fr. 50.
» longifolia × pyramidalis.
» » × cochlearis.
» » multicaulis.
» luteo-purpurea.
» luteo-viridis.
» Mac Nabiana.
» madeirensis.
» mædia *(calyciflora)*.
» mandschouriensis.
» marginata.
» Mertensiama.
» micrantha.
» micranthidifolia.

Saxifraga moschata.
» muretti.
» murithii (Mont-Cenis).
» muscoides.
» » atrorubens.
» mutata (fl. orangé), 5 gr. 4 fr.
» nervosa.
» nivalis.
» Nutkana (Canada).
» oppositifolia, 1 gr. 1 fr. 50.
» » grandiflora.
» patens (cæsia × mutata).
» pectinata.
» pedata.
» pedatifida.
» pedemontana.
» peltata.
» pennsylvanica.
» pentadactylis.
» pentaphylla.
» petræa.
» planifolia.
» polyphylla.
» porophylla.
» Portæ.
» primuloides.
» Probyni.
» Prostii.
» pseudo-Kotschyi.
» pseudo-sancta.
» pubescens.
» pulchella.
» punctata.
» purpurescens.
» pyramidalis.
» pyrenaica.
» ranuncifolia (ex Canada).
» recta.
» retusa.
» rhætica.
» Rhei superba.
» rivularis.
» Rocheliana.
» rosularis.
» rotundifolia.
» Salomoni.
» sancta.
» sarmentosa.
» scardica.
» Seguieri.
» serratifolia.
» sibirica.
» Siebthorpi.
» splendens.
» sponhemica.
» squarrosa.
» Stabiana.
» stellaris.

Saxifraga stenoglossa.
» stenopetala.
» Sternbergi.
» sturmiana.
» supraaizoides.
» Tellimoides.
» tenella.
» Thessalica.
» Tolmiæi (ex Canada).
» Tombeanensis.
» tricuspidata (ex Groënland).
» trifida.
» umbrosa, 5 gr. 3 fr.
» Valdensis.
» varians.
» villosa..
» virginiensis (ex Canada).
» Vochinensis.
» Wettsteini.
» Willkommiana.
» Zelebori.
» Zimeterii.

Germent avec facilité, mais, à cause de l'extrême ténuité de leurs graines, il faut soigner les semis et ne pas arroser trop fort. Il est bon de ne pas recouvrir les gr. et de semer à la surface du sol.

Scabiosa agrestis.
» » alba.
» amoena.
» argentea.
» caucasica.
» » perfecta.
» » à fl. blanches.
» » alba grandiflora.
» cretica.
» graminifolia, 5 gr. 2 fr.
» japonica (Japon).
» Lagodechiana.
» lucida.
» » à fl. blanches.
» lyratifolia (fl. grenat vif).
» ochroleuca.
» Olgae, 2 gr. 1 fr.
» petræa.
» songarica.
» suaveolens.
» talishensis.
» Wulfeni.
Schivereckia Bornmülleri.
» podolica.
Scopolia carniolica.
Scorodonia fœtida.
Scorzonera austriaca.
» rosea.
Scrophularia alata.

Scrophularia Hoppii.
» juratense.
» Marylandica.
» pyrenaica.
» vernalis.
Scutellaria alpina.
» » à fl. blanches.
La Scut. alp. est une excell. pl. traînante à fl. bleu lilas et blanc chez le type, très robuste et florifère.
» altissima.
» Baïkalensis. Superbe pl. à grandes fl. bleues.
» macrantha.
» orientale.
» tuberosa.
Sedum acre.
» acutifolium (Orient).
» aizoon.
» albescens.
» albidum.
» album.
» alsinæfolium.
» altissimum.
» anacampseros.
» anopetalum.
» asiaticum.
» atratum.
» atropurpureum.
» Beyrichianum.
» Brownei.
» carpathicum.
» corsicum.
» cruciatum.
» dasiphyllum
» divergens.
» Douglasi.
» elegans.
» Euphorbioides.
» Ewersii.
» fabaria.
» Forsterianum.
» gemmi ferum.
» glaucum.
» Hispanicum.
» kamtschaticum.
» Kirilowi.
» Laggeri.
» Littoreum.
» Lydium.
» maximowiczii.
» maximum.
» nicaense.
» obtusatum.
» olympicum.
» oppositifolium.
» oreganum.
Sedum pallidum.
» pilosum.
» populifolium
» Pottsii.
» pruinatum.
» pulchellum.
» purpurescens.
» reflexum.
» Rhodantum.
» rigidum.
» rubens.
» rubricaule (Tessin).
» serotinum.
» Sempervivum (Cotyled. Semp).
» sexifidum.
» spathulifolium.
» spectabile.
» » splendens.
» spurium.
» Stahlii.
» stenopetalum
» stoloniferum.
» telephium.
» turgidum.
» villosum.
» wallichianum.
Selliera radicans *(Goodenia radicans)*.
Sempervivum acuminatum.
» alpinum.
» anomalum.
» arachnoideum.
» arvernense.
» assimile.
» atroviolaceum.
» boutignanum.
» Braunii.
» bungeanum.
» Christii.
» ciliosum.
» cinarescens.
» comoli.
» debile.
» dolimiticum.
» Faucennetti.
» fimbriatum.
» flagelliforme.
» Fontanae.
» gaudini.
» glaucum.
» globiferum.
» Haussmanni.
» heuffeli.
» hirtum.
» Juratense.
» Kapaornikense.
» Lamottei.
» leucanthum.
» mettenianum.

Sempervivum montanum.
» Morelianum.
» parvulum.
» patens.
» Pittonii.
» pomelii.
» pyrenaicum.
» Reginæ-Amaliæ.
» Requienii.
» robustum.
» rubicundum.
» rupicolum.
» spinulifolium.
» tectorum.
» tenellum.
» Theobaldi.
» Thomayeri.
» tomentosum.
» triste.
» Valesiacum.
» veninensis.
» Verloti.
» Wulfeni.
» Zelebori.
» diverses espèces en mélange.
Senecillis carpathica.
Senecio abrotanifolius.
» adonidifolius.
» ætnensis.
» alpinus.
» aurantiacus (*Cineraria aurant.*).
» carniolicus.
» clivorum.
» cordatus.
» coriaceus.
» Correvonianus.
» doronicum, 10 gr. 5 fr.
C'est le beau « *Soleil d'or* » des Alpes, à capitules orange : pl. très brillante et aimant le soleil et la rocaille.
» Fendleri.
» Fuchsii, 5 g. 2 fr., pr ombre
» incanus, 1 gr. 1 fr. 50.
» jacquinianus.
» Ligularia.
» macrophyllus.
» nebrodensis.
» palmatifidus.
» pseudo-Arnica.
» pulcher.
» quinquæligulatus.
» sarracenicus, 10 gr. 5 fr., pour l'ombre.
» stenocephalus.
» Tanguticus.
» thapsoides.
» tyrolense.

Senecio uniflorus.
» Veitchianus.
» Wilsonianus.
Serratula monticola.
» nudicaulis.
» radiata.
» Vulpii.
Seseli cæspitosa.
» gummifer.
Sibbaldia maxima.
Sibbaldia parviflora.
» procumbens.
Sidalcea candida.
» malvæflora.
Sideritis condensata.
» Eubæa.
» hyssopifolia.
Silene acaulis, 5 gr. 4 fr.; 1 gr. 1 fr.
» » à fl. blanches.
» » grandiflora.
» alpestris.
» alpina.
» asterias (fl. en capitules, d'un rouge ardent), 10 gr. 2 fr.
» asterias grandiflora.
» auriculata.
» biflora.
» bryoides, 5 gr. 4 fr.; 1 gr. 1 fr.
» ciliata.
» cordifolia.
» Correvoniana.
» dinarica.
» Drummondi.
» Elisabethæ.
» elongata.
» exscapa, 1 gr. 1 fr.
» fimbriata.
» flavescens.
» Fortunei, 5 gr. 2 fr.
Ressemble à l'œillet superbe.
» fruticulosa.
» galatea.
» Græfferi.
» Legionensis.
» Lerchenfeldiana.
» maritima.
» melandriformis.
» mollissima.
» monachorum.
» nutans.
» odontopetala.
» oreades.
» Otita.
» Parnassi.
» petræa.
» pumilio.
» pusilla.
» quadrifida.

Silene reichenbachiana.
» rupestris.
» rupicola.
» saxifraga, 5 gr. 2 fr.
» Schafta, 5 gr. 2 fr.
L'une des rares pl. saxatiles d'automne ; fl. d'un carmin vif, cult. facile.
» Tatarica.
» Tomasiniana.
» tridensata.
» valesia.
» Veselowskyi.
» Zawadsky, 10 gr. 2 fr.
Silphium lanceolatum.
» terebinthinaceum.
Sissimbrium strictissimum.
Sissyrinchium anceps.
» Bermudianum.
Smilacina amplexicaulis (Canada).
» racemosa.
» californicum.
» stellata.
Smilax aspera.
Sobolewskia clavata.
Solanum calophyllum.
» Rantonnetii (ex. Rep. Argent.).
Soldanella alpina.
» montana.
» pusilla.
Solidago alpestris.
» canadensis.
» Drummondi.
» humilis.
» missouriensis.
» nitida.
» pallida.
» puberula, 10 gr. 4 fr.
» pygmæa.
» reflexa.
» Riddeli.
» rigida, 10 gr. 4 fr.
» rigidiscula, 10 gr, 4 fr.
» serotina.
» Shortii.
» spectabilis.
Spartium junceum, 10 gr. 2 fr. Le beau genêt d'or du Midi.
Sphaeralcea munroana.
Spigelia Marylandica.
Spiræa cæspitosa.
» filipendula.
» Kamtschatica.
» palmata.
Specularia speculum (*Miroir de Vénus*).
Stachys coccinea.
» corsica.
» citrina.
» Strybnuy.
» lanata.
» scardica.
Statice auriculata.
» coccinea.
» Gmelini.
» latifolia.
« Limonium.
» occidentalis.
» sinensis.
» Suworowi.
» virgata.
Statices des Canaries, non rustiques chez nous, mais qui constituent une ressource précieuse pour la serre froide et les appartements, grâce à leur perpétuelle floraison :
» arborescens (Statice en arbre).
» brassicæformis.
» fruticans (Statice en arbre).
» hybrida.
» imbricata.
» macrophylla.
» macroptera.
» Perezii.
» Perezii × inbricata.
» puberula.
Ces superbes pl. s'élèvent très facilement de graines.
Stipa gigantea.
» pennata.
Stobæa membranifolia.
» radula.
Stockesia cyanea.
Streptopus amplexifolius.
» brevipes (ex Canada).
» roseus (ex Canada).
Stylophorum diphyllum.
» japonicum.
» lasiocarpum.
Styrax Japonica.
» Obassia.
Suæda glauca (ex Japon).
Swertia connata.
» longifolia.
» perennis.
Symphiandra armena.
» Hoffmanni.
» transcaucasica.
Symphitum Bohemicun.
» bulbosum.
Synedesis aconitifolia.
Synthiris pinatifida.
» reniformis.
Tamus communis.
Tanacetum macrophyllum.

Tanacetum vulgare.
Tanakæ radicans.
Telekia speciosa, 10 gr. 2 fr.
» speciosissima (vrai).
Telephium imperati, 10 gr. 2 fr.
Telephium orientale, 10 gr. 2 fr.
Tetragonolobus purpureus.
» siliquosus.
Teucrium aureum.
» canum.
» Chamædrys, 10 gr. 4 fr.
» divaricatum.
» Eugenæum.
» flavum.
» lucidum.
» lusitanicum.
» massiliense (Herbe aux pommes).
» montanum.
» orientale, à fl. très élégantes. 10 gr. 5 fr.
» polium.
» pseudo-Chamædrys.
» pyrenaicum.
» Scorodonia. Excellent pour sous-bois, 10 gr. 4 fr.
Thalictrum aquilegifolium, 10 g. 3 fr. Le délicat Pigamont aux élégants panicules lilas.
» adiantifolium.
» cornuti.
» Delavayi, espèce chinoise superbe; 5 gr. 4 fr.
» diphterocarpum (id.), 1 g. 1 f. 50
» dioicum.
» flavum.
» fœtidum.
» glaucum.
» macrocarpum.
» majus, 10 gr. 2 fr.
» minus. Jolie verdure fine et gracieuse.
» occidentale (ex Canada).
» rubellum.
» saxatile.
Thelesperma gracilis.
Thermopsis Fabacea.
» lanceolata.
» montana.
» rhombifolia.
Thladiantha dubia.
Thlaspi bellidifolia.
» cepæfolia.
» Kowatzi.
» limosellaefolia.
» microstyla.
» montana.
Thlaspi rotundifolia, 5 gr. 4 fr.
» violascens.
Thymus marchallianum.
» serpyllum.
Tiarella cordifolia (jolie pl. d'ombre).
» poliphylla.
» purpurascens.
Tithonia tagetiflora.
Tofielda calyculata.
» glacialis.
Tofielda glutinosa (ex Canada).
» rubescens.
Tolmiæa Menziesii.
Tournefortia heliotropioides.
Towsendia grandiflora.
» Wilcoxiana.
Trachelium coeruleum.
Tradescantia undulatifolla.
Tragopogon porrifolius.
Trautvetteria palmata (ex Canada).
Trientalis europea.
» canadensis (ex Canada).
Trifolium alpinum.
» Badium.
» ochroleucum.
» pannonicum.
» spadiceum.
Trillium atropurpureum.
» californicum.
» cernuum.
» grandiflornm.
» Kamtschaticum.
» pendulum.
Triosteum pinnatifidum.
Tritoma, voir Kniphotia.
Trollius albiflorus.
» altaicus.
» americanus.
» asiaticus.
» aurantiacus.
» caltheoides.
» europæus, 10 gr. 2 fr. Le beau « Globe d'or » des reg. mont. qu'on élève et cultive facilement. Il fleurit abondamment si on lui donne un sol sain et une situation un peu fraîche. On en fait aussi de merveilleux bords d'étangs ou ruisseaux.
» hybridus.
» japonicus
» ledebourii.
» pumilus.
» sibiricus.
Tropæolum poliphyllum.
» pentaphyllum.
Tulipa greigii, la plus belle des tulipes.
» Darwini.

Tulipa marjoletti.
» Turkestinaca.
Tunica saxifraga, 10 gr. 3 fr.
» » à fl. blanches.
Tweedia cœrulea.
Ulex europaeus (ajonc), 10 gr. 2 fr.
Umbilicus pendulinus.
» semenovi (v. en outre Cotyledon).
Uniola latifolia.
Vaccinium Myrtillus *(Myrtille)*.
» pennsylvanicum.
» uliginosum.
» Vitis-Idæa *(Airelle)*.
Valeriana alliariæfolia.
» Dioscoridis.
» exaltata.
» globulariæfolia.
» longiflora (merveille orientale aux fl. rouge carmin vif).
» macrophylla.
» montana.
» officinalis.
» pyrenaica.
» Saliunca.
» sitchensis (ex Canada).
» supina.
» tripteris.
Vancouveria hexandra.
Vella spinosa.
Veratrum album.
» californicum.
» nigrum.
Verbascum Blattaria.
» Hænki.
» mucronatum.
» Olympicum, 5 gr. 2 fr.
» Phœniceum.
» Songaricum.
» Thapsus.
Verbena venosa (Verveine rustique).
Vernonia altissima.
» Arkansana.
» gigantea.
» glauca.
Veronica Allionii.
» alpina.
» amethystina.
» aphylla.
» argentea.
» austriaca.
» Balcana.
» bellidioides.
» Bidwilli.
» buxifolia.
» carnea.
» caucasica.
» Chamœdrys.
Veronica cinerea.
» crassifolia, 10 gr. 3 fr.
Grande pl. vivace à longs épis bleu foncé.
» foliosa.
» fruticulosa.
» gentianoides.
» grandis.
» Hulkeana.
» incana.
» longifolia, 10 gr. 3 fr. } mellifères.
» maritima. » }
» » alba.
» maxima.
» malisseafolia.
» multifida.
» nummularia.
» officinalis.
» orchidea.
» oxyphilla.
» paniculata, belle plante vivace recherchée des abeilles; longs épis bleus, 10 gr. 2 fr.
» pectinata.
» Ponæ.
» prenja.
» prostrata.
« » alba.
» rupestris.
» satureyoides.
» saxatilis.
» » à fl. blanches.
» serpyllifolia.
» spicata.
» » à fl. blanches.
» stenophylla.
» tenuifolia.
» Teucrium, fl. bleu d'azur, mai-août, 10 gr. 3 fr.
» Traversi.
La V. Traversi est la meilleure et la plus rustique des véroniques en arbustes, à feuilles opposées, persistante, à fl. en grappes d'un bleu pâle; c'est l'une des meilleures décorations des jardins dans nos pays, où il est regrettable qu'elle ne soit pas plus répandue. Excellente aussi pour la fleur coupée, 10 gr. 2 fr.
» urticæfolia.
Vesicaria sinuata.
» græca.
» utriculata. Belle esp. à fl. jaunes à planter dans les fentes de rochers, 10 gr. 3 fr.
Vicia aurantiaca.

Vicia dumetorum.
» fulgens.
» Onobrychioides.
» unijuga.
Viola adunca (ex Canada).
» alpina.
» altaica.
» arenaria.
» atlantica.
» Bertolini.
» biflora.
» Bosniaca.
» calcarata.
» » à fl. blanches.
» » flavescens.
» » grandiflora.
» » superflorens.
» campestris.
» canina.
» » alba.
» » rubra.
» cenisia.
» cognata.
» comollia (vrai).
» cornuta, 10 gr. 4 fr.
» » à fl. blanches, 10 g. 4 f.
» » var. perfection.
» » var. à fl. roses.
» declinata.
» delphinantha (ex Mont Athos).
» delphinifolia.
» dissecta.
» distans.
» elatior.
» Eugenia.
» Florariensis (variété hybride, voisine de rothomagensis et qui fleurit perpétuellement; l'une des meill. fl. alpines). 10 gr. 6 fr.
» Florar. alba.
» » tricolor.
» glabella (ex Canada).
» gracilis.
Viola heterophylla.
» Jovi.
» Labradorica (ex Canada).
» latisepala.
» lutea.
» macedonica.
» multifida.
» munbyana.
» nuttalli (ex Canada).
» oreocallis (ex Canada).
» orphanides.
» palustris.
» Patrini.
» pedatifida.
» pinnata.
» praemorsa (ex Canada).
» prionantha.
» pubescens (ex Canada).
» rothomagensis.
» sagittata.
» sarmentosa (ex Canada).
» stagnina.
» sudetica.
» Taygetea (ex Graecia).
» Tommasiniana.
» uliginosa.
» Wiedemanni.
» Zoyzii.
Vittadenia triloba. Délicieuse pâquerette rose en touffe, qui fleurit perpétuellement et décore admirablement rocailles, talus et vieux murs.
Waldstenia fragarioides.
Wahlenbergia lobelioides.
» nutabunda.
» saxicola.
Wiedemannia orientalis.
Wulfenia carinthiaca.
Xanthoceras sorbifolia, 10 gr. 1 fr.
Yucca glauca.
Zauschneria californica.
Zoyzinia absinthifolia.

Société générale d'imprimerie, 18, Pélisserie, Genève.

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE D'IMPRIMERIE, 18 PÉLISSERIE, GENÈVE